

グリーンペンコゼブ水和剤（マンゼブ水和剤）

適用害虫と使用方法

2017年3月22日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンゼブを含む農薬の総使用回数	
キャベツ	べと病	400～600倍	100～300L/10a	収穫30日前まで	3回以内	散布	3回以内	
はくさい	黒斑病 白斑病 べと病	600倍			1回		1回	
かぼちゃ	疫病 べと病	600～800倍		収穫21日前まで	2回以内		2回以内	
きゅうり	褐斑病 黒星病 炭疽病			収穫前日まで	3回以内		3回以内	
	べと病							
すいか	褐色腐敗病	600倍		収穫7日前まで	7回以内		7回以内	
	炭疽病 つる枯病	400～600倍						
メロン	つる枯病 べと病				5回以内			5回以内
アスパラガス(露地栽培)	茎枯病 斑点病	500倍		収穫終了後（但し、秋期まで）	6回以内		6回以内	
たまねぎ	黒斑病 灰色かび病 べと病	400～600倍		収穫3日前まで	5回以内		5回以内	
ねぎ	黒斑病 さび病 べと病	600倍	収穫14日前まで	3回以内	3回以内			
あずき	さび病	400倍	収穫30日前まで					
だいず	べと病		100～200L/10a	収穫45日前まで				
ばれいしょ	疫病 夏疫病	400～600倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	10回以内	10回以内（但し、無人ヘリ散布は3回以内）		
	疫病	100倍					25L/10a	

グリーンペンコゼブ水和剤（マンゼブ水和剤）

適用害虫と使用方法

2017年3月22日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンゼブを含む農薬の総使用回数
てんさい	褐斑病	400～600倍	100～300L/10a	収穫21日前まで	5回以内	散布	5回以内
		125倍	25L/10a				