

# サプロール乳剤（トリホリン乳剤）

適用病害と使用方法

2019年6月27日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トリホリンを含む農薬の総使用回数						
きゅうり	うどんこ病	1000～2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	5回以内	散布	5回以内						
メロン		2000倍			6回以内		6回以内						
トマト	1000倍	葉かび病			3回以内		3回以内						
ピーマン					うどんこ病		1000～2000倍	5回以内	5回以内				
なす	1500倍	3回以内								3回以内			
さやえんどう											2000倍	5回以内	5回以内
いちご	1000倍	白さび病								収穫14日前まで			
食用ぎく					800～1000倍		さび病	収穫前日まで	2回以内		2回以内		
ねぎ												1000倍	収穫3日前まで
しそ	800～1000倍	灰星病		200～700L/10a	収穫前日まで		5回以内	5回以内					
もも			1000倍			うどんこ病			1000倍	収穫14日前まで	4回以内	4回以内	
かき	1000～1500倍	白さび病		100～300L/10a	-		5回以内	5回以内					
きく			1000倍			うどんこ病 黒星病			1000倍	100～300L/10a	-	5回以内	
ばら	1000倍	さび病		1～2L/m <sup>2</sup>	発病初期		6回以内	6回以内					
芝			1000倍			フェアリリング病			10L/m <sup>2</sup>				
西洋芝(ベントグラス) 日本芝													