

ストロビードライフロアブル（クレソキシムメチル水和剤）

適用害虫と使用方法

2011年11月30日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クレソキシムメチルを含む農薬の総使用回数
かき(葉)	うどんこ病 炭疽病 灰色かび病 落葉病	3000倍	200～700L/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
かんきつ	黄斑病 褐色腐敗病	2000倍					
なし	黒点病 そうか病 そばかす病 灰色かび病	2000～3000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	うどんこ病 黒斑病 輪紋病						
	黒星病	3000倍					
りんご	炭疽病	2000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	赤星病 斑点落葉病	1500～3000倍					
	うどんこ病 黒星病 黒点病 モニア病	3000倍					
りんご	褐斑病 すす点病 すす斑病 炭疽病 輪紋病	2000～3000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内

ストロビードライフロアブル（クレソキシムメチル水和剤）

適用害虫と使用方法

2011年11月30日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クレソキシムメチルを含む農薬の総使用回数
もも 初刈り	うどんこ病 黒星病 黒斑病 縮葉病（休眠期） 灰星病	2000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
小粒核果類（うめ、すももを除く）	環紋葉枯病			収穫7日前まで			
うめ	うどんこ病 灰色かび病 環紋葉枯病 黒星病 すす斑病	2000～3000倍					
すもも	炭疽病 環紋葉枯病	2000倍					
ぶどう	うどんこ病 さび病	3000倍		収穫14日前まで			
	晩腐病 褐斑病 黒とう病 枝膨病 灰色かび病 べと病	2000～3000倍					
ブルーベリー	灰色かび病 斑点病	3000倍			2回以内		2回以内
マンゴー	炭疽病	2000倍		収穫前日まで	3回以内		3回以内
あけび（果実）	うどんこ病	3000倍		収穫7日前まで			
さんしょう（果実）	さび病	2000倍		収穫14日前まで	2回以内		2回以内

ストロビードライフロアブル（クレソキシムメチル水和剤）

適用害虫と使用方法

2011年11月30日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クレソキシムメチルを含む農薬の総使用回数
バナナ	黒星病	3000倍	200～700L/10a	収穫21日前まで	3回以内	散布	3回以内
かき	うどんこ病 炭疽病 灰色かび病 落葉病			収穫14日前まで			
キウイフルーツ	すす斑病 貯蔵病害（灰色かび病）	2000倍		収穫前日まで			
	灰色かび病	2000～3000倍					
ぼけ	赤星病 褐斑病	3000倍		発病初期			
じんちょうげ	黒点病						
やなぎ	葉さび病						
ホップ	マルヅニ落葉病						
せいようきんしばい	さび病						