

ダイアメリットDF（イミノクタジンアルベシル酸塩・ポリオキシン水和剤）

適用病害虫と使用方法

2020年2月26日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数	ポリオキシンを含む農薬の総使用回数	
ねぎ	黒斑病 さび病	1500倍	100～300L/ 10a	収穫30日前まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内	
きゅうり	うどんこ病 菌核病	1000～1500倍		収穫前日まで	2回以内		7回以内	2回以内	
	褐斑病 炭疽病 灰色かび病	1000倍							
トマト	うどんこ病 つる枯病	1500倍					5回以内	5回以内	5回以内（但し、塗布は1回以内）
トマト	うどんこ病 菌核病 すすかび病 灰色かび病 葉かび病 アザミウマ類						3回以内	3回以内	3回以内
なす	うどんこ病 菌核病 黒枯病 すすかび病 灰色かび病	1000～1500倍							
	アザミウマ類	1000倍							
いちご	うどんこ病	2000倍		収穫開始14日前まで			10回以内（但し、育苗期は5回以内、本圃では5回以内）		

ダイアメリットDF（イミノクタジンアルベシル酸塩・ポリオキシン水和剤）

適用病害虫と使用方法

2020年2月26日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数	ポリオキシンを含む農薬の総使用回数
いちご	うどんこ病	2000倍	100～300L/ 10a	収穫開始14日 前まで	3回以内	散布	10回以内（ 但し、育苗 期は5回以 内、本圃で は5回以内 ）	3回以内
				育苗期（定植 前）	1回			