

ネビジン粉剤（フルスルファミド粉剤）

適用病害と使用方法

2024年3月13日現在

作物名	適用病害名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルスルファミドを含む農薬の総使用回数			
ばれいしょ	そうか病 粉状そうか病	60kg/10a	植付時	1回	全面土壌混和	2回以内(但し、 種いも浸漬は1 回以内、土壌混 和は1回以内)			
	そうか病	30kg/10a			作条土壌混和				
かぶ	根こぶ病		は種又は定植前	1回	全面土壌混和	1回			
		20kg/10a			作条土壌混和				
だいこん		30kg/10a	は種前		全面土壌混和				
カリフラワー		20～30kg/10a	は種又は定植前						
		20kg/10a			作条土壌混和				
ブロッコリー		20～30kg/10a			全面土壌混和				
		20kg/10a			作条土壌混和				
非結球あぶらな科葉菜類 (なばな類を除く)		20～30kg/10a			全面土壌混和				
		20kg/10a			作条土壌混和				
なばな類		20～30kg/10a			全面土壌混和				
		20kg/10a	定植前		作条土壌混和				
		20～30kg/10a	は種前						
キャベツ		菌核病	30kg/10a		定植前		2回以内	全面土壌混和	2回以内
		根こぶ病	20～30kg/10a		は種又は定植前			作条土壌混和	
	20kg/10a								
はくさい		20～30kg/10a		1回	全面土壌混和	1回			
		20kg/10a			作条土壌混和				
レタス 非結球レタス	菌核病	20～30kg/10a	定植前		全面土壌混和				

適用拡大登録月日：2024年03月13日