

ネビジン粉剤（フルスルファミド粉剤）

適用病害と使用方法

2024年3月13日現在

| 作物名 | 適用病害名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | フルスルファミドを含む農薬の総使用回数 | | | |
|--------------------------|----------------|-------------|-------------|---------|---------|---|------|--------|------|
| ばれいしょ | そうか病 粉状そうか病 | 60kg/10a | 植付時 | 1回 | 全面土壌混和 | 2回以内(但し、 種いも浸漬は1 回以内、土壌混 和は1回以内) | | | |
| | そうか病 | 30kg/10a | | | 作条土壌混和 | | | | |
| かぶ | 根こぶ病 | | は種又は定植前 | 1回 | 全面土壌混和 | 1回 | | | |
| | | 20kg/10a | | | 作条土壌混和 | | | | |
| だいこん | | 30kg/10a | は種前 | | 全面土壌混和 | | | | |
| カリフラワー | | 20～30kg/10a | は種又は定植前 | | | | | | |
| | | 20kg/10a | | | 作条土壌混和 | | | | |
| ブロッコリー | | 20～30kg/10a | | | 全面土壌混和 | | | | |
| | | 20kg/10a | | | 作条土壌混和 | | | | |
| 非結球あぶらな科葉菜類 (なばな類を除く) | | 20～30kg/10a | | | 全面土壌混和 | | | | |
| | | 20kg/10a | | | 作条土壌混和 | | | | |
| なばな類 | | 20～30kg/10a | | | 全面土壌混和 | | | | |
| | | 20kg/10a | 定植前 | | 作条土壌混和 | | | | |
| | | 20～30kg/10a | は種前 | | | | | | |
| キャベツ | | 菌核病 | 30kg/10a | | 定植前 | | 2回以内 | 全面土壌混和 | 2回以内 |
| | | 根こぶ病 | 20～30kg/10a | | は種又は定植前 | | | 作条土壌混和 | |
| | 20kg/10a | | | | | | | | |
| はくさい | | 20～30kg/10a | | 1回 | 全面土壌混和 | 1回 | | | |
| | | 20kg/10a | | | 作条土壌混和 | | | | |
| レタス 非結球レタス | 菌核病 | 20～30kg/10a | 定植前 | | 全面土壌混和 | | | | |

適用拡大登録月日：2024年03月13日