

パスポートフロアブル (TPN水和剤)

適用病害と使用方法

2009年8月19日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	TPNを含む農薬の総使用回数
なし	黒斑病	250～400倍	休眠期	1回	散布	3回以内 (但し、休眠期は1回以内)
西洋なし	ごま色斑点病	1000倍	収穫30日前まで	3回以内		3回以内
りんご	褐斑病 すす点病 すす斑病 炭疽病 輪紋病		収穫45日前まで			
	黒星病 斑点落葉病 モモア病	1000～1500倍				
ぶどう	晩腐病	250～400倍	休眠期	1回		3回以内 (但し、休眠期は1回以内)
	黒とう病	250倍				
かき	炭疽病 落葉病	1500倍	収穫30日前まで	3回以内		3回以内
芝(バントグラス)	葉腐病 (ブラウンパッチ)	650～1000倍	発病初期	8回以内	1㎡当り1L散布	8回以内
芝(バントグラス) 芝(日本芝)	ヘルミントスポリウム葉枯病	1000倍				

パスポートフロアブル (TPN水和剤)

2009年8月19日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	TPNを含む農薬の総使用回数
芝(ベントグラス) 芝(日本芝)	藻類	芝生育期 (藻類発生前)	1.0~1.54L/ 10a	1000L/10a	8回以内	散布	8回以内