

フルピカフロアブル（メパニピリム水和剤）

適用病害と使用方法

2024年7月24日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メパニピリムを含む農薬の総使用回数
ねぎ	小菌核腐敗病	2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	4回以内	散布	4回以内
あずき	灰色かび病			収穫14日前まで	5回以内		5回以内
いんげんまめ		2000～3000倍					
きゅうり	うどんこ病 褐斑病 灰色かび病						
かぼちゃ すいか メロン		2000～3000倍	100～300L/10a			常温煙霧	
トマト ミニトマト	灰色かび病					67倍	
なす	うどんこ病 黒枯病 灰色かび病	67倍	10L/10a			散布	
	うどんこ病					67倍	
ピーマン		2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
パセリ		3000倍	0a				
いちご	うどんこ病 灰色かび病	2000～3000倍	5L/10a	収穫前日まで	3回以内		3回以内
		50倍					
	うどんこ病	100倍	10L/10a	常温煙霧			
かんきつ	灰色かび病	2000～3000倍	200～700L/10a	開花期～幼果期（但し、収穫90日前まで）	2回以内	散布	2回以内
なし	黒星病	2000倍		収穫21日前まで	5回以内		5回以内
りんご	うどんこ病 モリア病						

適用拡大登録月日：2024年07月24日

フルピカフロアブル（メパニピリム水和剤）

適用病害と使用方法

2024年7月24日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メパニピリムを含む農薬の総使用回数
りんご	うどんこ病 モリア病	2000倍	200～700L/10a	収穫21日前まで	5回以内	散布	5回以内
	黒星病	2000～6000倍					
	斑点落葉病	2000～4000倍					
びわ	灰色かび病	2000～3000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	3回以内	3回以内	
もも	うどんこ病 黒星病 灰星病	2000倍		収穫前日まで	5回以内	5回以内	
ぶどう	うどんこ病 灰色かび病	2000～3000倍		収穫30日前まで	2回以内	2回以内	
ラズベリー	灰色かび病	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	3回以内	
マンゴー			200～700L/10a	収穫14日前まで	5回以内		
かき	うどんこ病 灰色かび病	2000～3000倍	100～300L/10a	発病初期	5回以内	5回以内	
花き類・観葉植物(ばら、スターフス、宿根かすみそう、ゆり、りんどうを除く)	灰色かび病						
宿根かすみそう	うどんこ病 灰色かび病	2000倍 2000～3000倍					
スターフス	うどんこ病 灰色かび病	2000倍 2000～3000倍	3000倍				
ばら	うどんこ病 黒星病 灰色かび病						


適用拡大登録月日：2024年07月24日

フルピカフロアブル（メパニピリム水和剤）

適用病害と使用方法

2024年7月24日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メパニピリムを含む農薬の総使用回数
ゆり	灰色かび病 葉枯病	2000～3000倍	100～300L/10a	発病初期	5回以内	散布	5回以内
りんどう	褐斑病 黒斑病	2000倍	200～700L/10a				
	灰色かび病	2000～3000倍					
樹木類(かしを除く)	うどんこ病 灰色かび病	2000倍					
かし	うどんこ病 灰色かび病 紫かび病						

 適用拡大登録月日：2024年07月24日