

プロポーズ顆粒水和剤（ベンチアバリカルブイソプロピル・TPN水和剤）

適用病害と使用方法

2024年4月24日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベンチアバリカルブイソプロピルを含む農薬の総使用回数	TPNを含む農薬の総使用回数	
ばれいしょ	疫病 夏疫病	750～1000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	5回以内	散布	5回以内	5回以内	
		250倍	25L/10a						
		32倍	3.2L/10a			無人航空機による散布			
		16倍	1.6L/10a						
たまねぎ	灰色かび病 白色疫病 べと病	1000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内	6回以内	
らっきょう	白色疫病								3回以内
ねぎ	葉枯病 べと病								4回以内(但し、土壌灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内)
だいず	茎疫病 紫斑病 べと病								2回以内
きゅうり	うどんこ病 褐斑病 黒星病	3回以内	収穫前日まで	3回以内	3回以内	14回以内(但し、土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計12回以内)			

適用拡大登録月日：2024年04月24日

プロポーズ顆粒水和剤（ベンチアバリカルブイソプロピル・TPN水和剤）

適用病害と使用方法

2024年4月24日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベンチアバリカルブイソプロピルを含む農薬の総使用回数	TPNを含む農薬の総使用回数			
きゅうり	べと病	1000～1500倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	14回以内（但し、土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びIアゾル剤の噴射は合計12回以内）			
かぼちゃ	うどんこ病 疫病 べと病	1000倍		収穫7日前まで	5回以内					5回以内	3回以内
すいか	褐色腐敗病 炭疽病			収穫3日前まで				5回以内			5回以内
メロン	つる枯病 べと病										
トマト	疫病	1000～1500倍		収穫前日まで	3回以内			3回以内	6回以内（但し、土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びIアゾル剤の噴射は合計4回以内）		
	葉かび病	1000倍									
ミニトマト	疫病	1500倍			2回以内		2回以内				

適用拡大登録月日：2024年04月24日

プロポーズ顆粒水和剤（ベンチアバリカルブイソプロピル・TPN水和剤）

適用病害と使用方法

2024年4月24日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベンチアバリカルブイソプロピルを含む農薬の総使用回数	TPNを含む農薬の総使用回数
なす	褐色腐敗病 すすかび病	1000倍	100～300L/ 10a	収穫前日まで	4回以内	散布	4回以内	4回以内
ブロッコリー	べと病			出蕾前(但し、 収穫21日前まで)	2回以内		3回以内	3回以内(但し、 土壌灌注は1回以内、 散布及び無人航空機 散布は合計2回以内)
キャベツ				収穫14日前まで			2回以内	3回以内(但し、 は種又は定植前の土 壌混和は1回以内、 散布、無人航空機 散布及びエアリアル 剤の噴射は合計2回 以内)
はくさい	黒斑病 白さび病 白斑病 べと病			収穫7日前まで			3回以内	3回以内(但し、 は種又は定植前の土 壌混和は1回以内、 散布及び無人航空機 散布は合計2回以内)
アスパラガス	疫病	1500倍		収穫前日まで	3回以内		4回以内	

適用拡大登録月日：2024年04月24日