

プロポーズ顆粒水和剤（ベンチアバリカルブイソプロピル・TPN水和剤）

適用病害と使用方法

2018年11月7日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベンチアバリカルブイソプロピルを含む農薬の総使用回数	TPNを含む農薬の総使用回数	
キャベツ	べと病	1000倍	100～300L/ 10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内	3回以内（但し、は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布及びエアゾル剤の噴射は合計2回以内）	
はくさい	黒斑病 白さび病 白斑病 べと病			収穫7日前まで				3回以内	3回以内（但し、は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布は2回以内）
ブロッコリー	べと病			出蕾前（但し、収穫21日前まで）				3回以内	3回以内（但し、土壌灌注は1回以内、散布は2回以内）
かぼちゃ	うどんこ病 疫病 べと病			収穫7日前まで				3回以内	3回以内

プロポーズ顆粒水和剤（ベンチアバリカルブイソプロピル・TPN水和剤）

適用病害と使用方法

2018年11月7日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベンチアバリカルブイソプロピルを含む農薬の総使用回数	TPNを含む農薬の総使用回数
きゅうり	うどんこ病 褐斑病 黒星病	1000倍	100～300L/ 10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	10回以内（ 但し、土壌 灌注は2回 以内、散布 及びくん煙 及びエアゾ ル剤の噴射は 合計8回以 内）
	べと病	1000～1500倍						
すいか	褐色腐敗病 炭疽病	1000倍		収穫3日前まで	5回以内		5回以内	5回以内
メロン	つる枯病 べと病							
トマト	疫病	1000～1500 倍		収穫前日まで	3回以内		3回以内	6回以内（ 但し、土壌 灌注は2回 以内、散布 及びくん煙 及びエアゾ ル剤の噴射は 合計4回以 内）
	葉かび病	1000倍						
ミニトマト	疫病	1500倍			2回以内		2回以内	
なす	褐色腐敗病 すすかび病	1000倍			4回以内		4回以内	4回以内
アスパラガス	疫病	1500倍			3回以内		3回以内	

プロポーズ顆粒水和剤（ベンチアバリカルブイソプロピル・TPN水和剤）

適用病害と使用方法

2018年11月7日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベンチアバリカルブイソプロピルを含む農薬の総使用回数	TPNを含む農薬の総使用回数
たまねぎ	灰色かび病 白色疫病 べと病	1000倍	100～300L/ 10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内	6回以内
らっきょう	白色疫病			収穫14日前まで				3回以内
ねぎ	葉枯病 べと病			4回以内（但し、土壌灌注は1回以内、散布は3回以内）				
だいず	茎疫病 紫斑病 べと病			収穫21日前まで	2回以内			2回以内
ばれいしょ	疫病	750～1000倍	25L/10a	収穫7日前まで	5回以内	5回以内	5回以内	
		250倍						
	夏疫病	1000倍	100～300L/ 10a					