

# ベフラン液剤25（イミノクタジン酢酸塩液剤）

適用病害と使用方法

2020年6月18日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数	
麦類(小麦を除く)	網斑病 条斑病 なまぐさ黒穂病 斑葉病 紅色雪腐病 心枯病	原液	乾燥種子1kg 当り3～5ml	は種前	1回	種子吹き付け処理 又は塗沫処理	3回以内（但し、種子への処理は1回以内、散布は2回以内、出穂期以降は1回以内）	
	なまぐさ黒穂病	1000～2000倍	-					10～30分間種子浸漬
	斑葉病	250～500倍						
	雪腐大粒菌核病 紅色雪腐病	1000倍	60～150L/10 a	根雪前	2回以内	散布		
	紅色雪腐病	5倍	乾燥種子1kg当 り15～25ml	は種前	1回	塗沫処理		
		10倍	乾燥種子1kg当 り30～50ml					
小麦	赤かび病	1000～2000 倍	60～150L/10 a	収穫14日前まで	3回以内（但し、出穂期以降は1回以内）	散布	4回以内（但し、種子への処理は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内、出穂期以降は1回以内）	
	うどんこ病 葉枯症	1000倍						
	条斑病 なまぐさ黒穂病 紅色雪腐病 心枯病	原液	乾燥種子1kg 当り3～5ml	は種前	1回	種子吹き付け処理 又は塗沫処理		
	なまぐさ黒穂病	1000～2000 倍	-			10～30分間種子浸漬		

# ベフラン液剤25（イミノクタジン酢酸塩液剤）

適用病害と使用方法

2020年6月18日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数
小麦	雪腐大粒菌核病 紅色雪腐病	1000倍	60～150L/10a	根雪前	3回以内（但し、出穂期以降は1回以内）	散布	4回以内（但し、種子への処理は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内、出穂期以降は1回以内）
	紅色雪腐病	250倍	25L/10a	は種前			
		5倍	乾燥種子1kg当り15～25ml				
		10倍	乾燥種子1kg当り30～50ml		1回	塗沫処理	
アスパラガス	茎枯病	1000倍	100～300L/10a	収穫終了後（冬期まで）	5回以内	散布	5回以内
かんきつ（みかん、ゆずを除く）	貯蔵病害（青かび病） 貯蔵病害（緑かび病）	2000～3000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	2回以内		2回以内
	貯蔵病害（白かび病） 貯蔵病害（黒腐病） 貯蔵病害（すす斑病）	2000倍					
みかん	貯蔵病害（青かび病） 貯蔵病害（緑かび病）	2000～3000倍			3回以内		3回以内
	貯蔵病害（白かび病） 貯蔵病害（黒腐病） 貯蔵病害（すす斑病）	2000倍					

# ベフラン液剤25（イミノクタジン酢酸塩液剤）

適用病害と使用方法

2020年6月18日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数
ゆず	貯蔵病害（青かび病） 貯蔵病害（緑かび病）	2000～3000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
	貯蔵病害（白かび病） 貯蔵病害（黒腐病） 幹腐病 貯蔵病害（すす斑病）	2000倍					
なし	黒星病	1000倍		収穫後～休眠期	1回		5回以内（但し、塗布剤は2回以内、液剤は1回以内）
	黒斑病	250倍		休眠期			
りんご	うどんこ病 黒星病 腐らん病 モニア病	1000倍		展葉期	6回以内（但し、開花期以降散布は3回以内）		8回以内（但し、液剤及び水和剤は合計6回以内（開花期以降は3回以内）、塗布剤は2回以内）
	褐斑病 すす点病 すす斑病 斑点落葉病 輪紋病	1500～2000倍		収穫前日まで			
	黒星病	1500倍					

# ベフラン液剤25（イミノクタジン酢酸塩液剤）

適用病害と使用方法

2020年6月18日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数
りんご	腐らん病	500～1000倍	200～700L/10a	休眠期	6回以内（但し、開花期以降散布は3回以内）	散布	8回以内（但し、液剤及び水和剤は合計6回以内（開花期以降は3回以内）、塗布剤は2回以内）
	紫紋羽病	250倍	-	苗木植付前	-	根部浸漬	
マルメロ かりん	腐らん病	1500倍	200～700L/10a	展葉期	4回以内（但し、開花期以降散布は3回以内）	散布	4回以内（但し、開花期以降は3回以内）
もも	縮葉病	250～500倍		休眠期	1回		3回以内（但し、休眠期は1回以内）
ぶどう	晩腐病	250倍		休眠期	1回		3回以内（但し、休眠期は1回以内、生育期は2回以内）
	褐斑病 つる割病			収穫60日前まで	2回以内		
	黒とう病	250倍 1000倍	休眠期	1回			
	枝膨病	1000倍	収穫60日前まで	2回以内			
りんどう	黒斑病 葉枯病 花腐菌核病	1500倍	100～700L/10a	-	8回以内		8回以内