

サターン乳剤（ベンチオカーブ乳剤）

適用雑草と使用方法

2021年5月26日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	ベンチオカーブを含む農薬の総使用回数
稲(箱育苗)	一年生雑草	は種後出芽前(雑草発生前)	育苗箱(30×60cm)1箱当り0.13ml	育苗箱(30×60cm)1箱当り13ml	1回	育苗箱の土壌に均一に散布する	1回
直播水稻	マツバイ 一年生雑草	は種直後～稲出芽前(入水15日前まで)	600～1200ml/10a	50～100L/10a		乾田・落水状態で全面土壌散布	2回以内(但し、入水前は1回以内、入水後は1回以内)
		稲出芽揃期～ルビエ1.5葉期(但し、収穫90日前まで)(入水15日前まで)	1000～1500ml/10a				
レタス(トンネル・マルチ栽培) レタス(春播移植栽培) 非結球レタス(トンネル・マルチ栽培) 非結球レタス(春播移植栽培)	一年生雑草	定植前、マルチ前(雑草発生前)	800～1000ml/10a	60～100L/10a	1回	土壌全面処理	1回
えぞまつ(床替床) すぎ(床替床) とどまつ(床替床) ひのき(床替床)		床替活着後(雑草発生前)	600～800ml/10a	200～300L/10a(200～300ml/m ²)	3回以内	所定薬量を所定量の水にうすめ噴霧機などで土壌面にむらなく散布する	3回以内