

ポリベリン水和剤（イミノクタジン酢酸塩・ポリオキシシン水和剤）

適用病害と使用方法

2021年8月25日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数	ポリオキシシンを含む農薬の総使用回数
にんじん	黒葉枯病 斑点病	1500～2000倍	100～300L/ 10a	収穫14日前まで	5回以内	散布	5回以内（但し、種子粉衣は1回以内、無人航空機散布は2回以内）	5回以内
たまねぎ	灰色かび病 灰色腐敗病	750～1000倍		収穫3日前まで			5回以内	
にんにく	黄斑病 葉枯病	1000～1500倍			3回以内		3回以内	3回以内
ねぎ	黄斑病 黒斑病 葉枯病 小菌核腐敗病 アザミウマ	1500倍		収穫14日前まで				
きゅうり	うどんこ病	1000～2000倍		収穫前日まで	2回以内		7回以内	2回以内
	褐斑病 灰色かび病 アザミウマ類 ハダニ類	1000倍						
かぼちゃ	うどんこ病 つる枯病	1000～2000倍		収穫7日前まで	3回以内		4回以内	3回以内
すいか	うどんこ病			収穫前日まで	4回以内			5回以内
	炭疽病 つる枯病 ハダニ類	1000倍						
トマト	うどんこ病	1500～2000倍			5回以内	5回以内	5回以内（但し、塗布は1回以内）	

ポリベリン水和剤（イミノクタジン酢酸塩・ポリオキシン水和剤）

適用病害と使用方法

2021年8月25日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数	ポリオキシンを含む農薬の総使用回数
トマト	うどんこ病	1500～2000倍	100～300L/ 10a	収穫前日まで	5回以内	散布	5回以内	5回以内（但し、塗布は1回以内）
	つる枯病 アザミウマ類 ハダニ類	1500倍						
なす	うどんこ病 褐色斑点病 灰色かび病 アザミウマ類 ハダニ類	1000倍	200～700L/ 10a	収穫21日前まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内
かんきつ（みかん、 たんかんを除く）	そうか病 灰色かび病	750～1000倍 750～1500倍			2回以内		2回以内	2回以内
たんかん	赤衣病 そうか病	750～1000倍	200～700L/ 10a	開花期～幼果期	3回以内	散布	3回以内	5回以内
	灰色かび病	750～1500倍						
みかん	そうか病 灰色かび病	750～1000倍 750～1500倍	200～700L/ 10a	開花期～幼果期	3回以内	散布	3回以内	5回以内
	なし	うどんこ病 黒星病 輪紋病						

ポリベリン水和剤（イミノクタジン酢酸塩・ポリオキシン水和剤）

適用病害と使用方法

2021年8月25日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数	ポリオキシンを含む農薬の総使用回数
なし	うどんこ病 黒星病 輪紋病	1500倍	200～700L/ 10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	5回以内（ 但し、塗布剤は2回以内、液剤は1回以内）	5回以内（ 但し、イミノクタジン酢酸塩・ポリオキシン水和剤は3回以内）
	黒斑病	1500～2000倍						
りんご	うどんこ病 褐斑病 黒星病	1500倍		収穫3日前まで			8回以内（ 但し、液剤及び水和剤は合計6回以内（開花期以降は3回以内）、塗布剤は2回以内）	5回以内（ 但し、散布は3回以内）
	すす点病 すす斑病 斑点落葉病	1500～2000倍						
うめ	黒星病 すす斑病 灰色かび病	1000倍		収穫30日前まで			3回以内	3回以内
ぶどう	うどんこ病	750～2000倍		収穫60日前まで	2回以内		3回以内（但し、休眠期は1回以内、生育期は2回以内）	5回以内

ポリベリン水和剤（イミノクタジン酢酸塩・ポリオキシシン水和剤）

適用病害と使用方法

2021年8月25日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数	ポリオキシシンを含む農薬の総使用回数
ぶどう	うどんこ病	750～2000倍	200～700L/ 10a	収穫60日前まで	2回以内	散布	3回以内（ 但し、休眠期は1回以内、生育期は2回以内）	5回以内
	晩腐病 褐斑病 黒とう病	750～1000倍						
	灰色かび病	750～1500倍						
かき	うどんこ病 炭疽病 灰色かび病	1000～2000倍		収穫30日前まで	3回以内		3回以内	3回以内
花き類・観葉植物（ストック、スターチス、チューリップ、ばら、カルマ、きくを除く）	灰色かび病	1000倍	100～300L/ 10a	発病初期	8回以内		8回以内	8回以内
きく	白さび病 灰色かび病							
カルマ	さび斑病 灰色かび病							
スターチス	うどんこ病 灰色かび病							
ストック	菌核病 灰色かび病							

ポリベリン水和剤（イミノクタジン酢酸塩・ポリオキシン水和剤）

適用病害と使用方法

2021年8月25日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数	ポリオキシンを含む農薬の総使用回数			
チューリップ°	褐色斑点病 灰色かび病	1000倍	100～300L/ 10a	発病初期	8回以内	散布	8回以内	8回以内			
ばら	うどんこ病	1000～2000倍	200～700L/ 10a		3回以内				5回以内	3回以内	3回以内
	灰色かび病	1000倍									
樹木類(かし、まさき、さるすべりを除く)	うどんこ病 灰色かび病										
さるすべり	うどんこ病	1000～2000倍									
	灰色かび病	1000倍									
まさき	うどんこ病	1000～2000倍									
	灰色かび病	1000倍									
かし	うどんこ病 灰色かび病 紫かび病		3回以内	3回以内	3回以内						