

ベルコート水和剤（イミノクタジンアルベシル酸塩水和剤）

適用病害と使用方法

2024年12月25日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数
ばれいしょ	夏疫病	500倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	5回以内	散布	5回以内
やまのいも	葉渋病	1000～2000倍					5回以内(但し、種いもへの処理は1回以内、無人航空機散布は3回以内)
にんじん	菌核病	1000倍		収穫14日前まで			5回以内(但し、種子粉衣は1回以内、無人航空機散布は2回以内)
	黒葉枯病	500～1000倍					
たまねぎ	灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病	1000倍		収穫前日まで			5回以内
にんにく	葉枯病	1000～1500倍		収穫3日前まで	3回以内		3回以内
ねぎ	黒斑病 さび病 葉枯病	2000倍		収穫30日前まで			
豆類(種実、ただし、だいずを除く)	うどんこ病 褐斑病 炭疽病	1000倍		収穫7日前まで			
うり類(漬物用)	うどんこ病 炭疽病 つる枯病	2000～4000倍		収穫3日前まで	5回以内		5回以内
きゅうり	うどんこ病 炭疽病 灰色かび病			収穫前日まで	7回以内		7回以内
	褐斑病	2000倍					

適用拡大登録月日：2024年12月25日

ベルコート水和剤（イミノクタジンアルベシル酸塩水和剤）

適用病害と使用方法

2024年12月25日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数
ズッキーニ	うどんこ病	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	7回以内	散布	7回以内
かぼちゃ		1000～2000倍		収穫7日前まで	4回以内		4回以内
すいか	うどんこ病 菌核病 炭疽病 つる枯病	1000倍		収穫前日まで			
メロン					うどんこ病 つる枯病	5回以内	5回以内
トマト	灰色かび病	3000～6000倍			3回以内		3回以内
ミニトマト	葉かび病	6000倍			2回以内		2回以内
なす	うどんこ病 すすかび病 灰色かび病	3000倍			3回以内		3回以内
キャベツ					菌核病	1000倍	収穫14日前まで
レタス	菌核病 灰色かび病	1000～2000倍					
アスパラガス	褐斑病 茎枯病 斑点病	1000倍	100～500L/10a	収穫7日前まで	5回以内		5回以内
いちご	うどんこ病	4000倍	100～300L/10a	収穫前日まで（生育期）			10回以内（但し、育苗期は5回以内、本圃では5回以内）
	うどんこ病 炭疽病	1000倍		育苗期（定植前）			


適用拡大登録月日：2024年12月25日

ベルコート水和剤（イミノクタジンアルベシル酸塩水和剤）

適用病害と使用方法

2024年12月25日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数
かんきつ(みかんを除く)	そうか病 貯蔵病害(緑かび病) 灰色かび病	2000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
みかん		1000～2000倍			3回以内		3回以内
なし	うどんこ病 黒星病 黒斑病 輪紋病	1000～1500倍		収穫14日前まで	5回以内		5回以内(但し、塗布剤は2回以内、液剤は1回以内)
りんご	うどんこ病 黄腐病	1000倍	収穫前日まで	6回以内(但し、開花期以降散布は3回以内)	8回以内(但し、液剤及び水和剤は合計6回以内(開花期以降は3回以内)、塗布剤は2回以内)		
	褐斑病 黒点病 すす点病 すす斑病 輪紋病	1000～1500倍					
	黒星病 斑点落葉病	1000～2000倍					

 適用拡大登録月日：2024年12月25日

ベルコート水和剤（イミノクタジンアルベシル酸塩水和剤）

適用病害と使用方法

2024年12月25日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数
びわ	灰色かび病 灰斑病	1000倍	200～700L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
		10倍	4L/10a				
おうとう	灰星病	1000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内(但し、休眠期は1回以内)
もも	うどんこ病 すすかび病 灰星病 柿フシ腐敗病 果実赤点病 黒星病	1000～2000倍	2000倍				
小粒核果類(うめ、すももを除く)	黒星病 すす斑病 灰色かび病 灰星病 環紋葉枯病	2000倍					
うめ	枝枯病 黒星病 すす斑病 灰色かび病 灰星病 環紋葉枯病		1000～2000倍	収穫3日前まで	2回以内	2回以内	
すもも	灰星病	1000倍		収穫14日前まで			
マンゴ-	炭疽病	3000倍					
あけび(果実)	うどんこ病						


適用拡大登録月日：2024年12月25日

ベルコート水和剤（イミノクタジンアルベシル酸塩水和剤）

適用病害と使用方法

2024年12月25日現在


作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数
かき	うどんこ病 黒星病 すす点病 炭疽病 灰色かび病 落葉病	1000～1500倍	200～700L/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
キウイフルーツ	果実軟腐病 貯蔵病害(灰色かび病) 灰色かび病	1000倍	200～400L/10a	収穫前日まで	5回以内		5回以内
樹木類	炭疽病			発病初期	3回以内		3回以内
茶	新梢枯死症(輪斑病菌による) 炭疽病 輪斑病			摘採7日前まで	2回以内		2回以内
たばこ	赤星病 うどんこ病 灰色かび病	1000～2000倍	100～180L/10a	収穫10日前まで			

 適用拡大登録月日：2024年12月25日

ベルコート水和剤（イミノクタジンアルベシル酸塩水和剤）

2024年12月25日現在

作物名	適用病害虫	使用液量	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンアルベシル酸塩を含む農薬の総使用回数
やまのいも	青かび病	種いも重量の1%	-	植付前	1回	種いも粉衣	5回以内(但し、種いもへの処理は1回以内、無人航空機散布は3回以内)
にんじん	黒葉枯病	乾燥種子重量の0.5%		は種前		種子粉衣	5回以内(但し、種子粉衣は1回以内、無人航空機散布は2回以内)

 適用拡大登録月日：2024年12月25日