

ベルコートフロアブル（イミノクタジンアルベシル酸塩水和剤）

適用病害と使用方法

2024年2月28日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数
やまのいも	青かび病	200倍	-	植付前	1回	1～10分間種いも浸漬	5回以内(但し、種いもへの処理は1回以内、無人航空機散布は3回以内)
	炭疽病 葉洗病	1000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	5回以内	散布	
	葉洗病	12倍	3L/10a		3回以内	無人航空機による散布	
にんじん	うどんこ病 菌核病 黒葉枯病 斑点病	1000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	5回以内	散布	5回以内(但し、種子粉衣は1回以内、無人航空機散布は2回以内)
	斑点病	8倍	2L/10a		2回以内	無人航空機による散布	
たまねぎ	灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病	1000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	5回以内	散布	5回以内
らっきょう	灰色かび病			収穫7日前まで			
きゅうり	うどんこ病 褐斑病 菌核病 黒星病 炭疽病 灰色かび病	2000倍		収穫前日まで	7回以内		7回以内
にがうり	うどんこ病			4000倍			
かぼちゃ		1000～2000倍		収穫7日前まで	4回以内		4回以内

適用拡大登録月日：2024年02月28日

ベルコートフロアブル（イミノクタジンアルベシル酸塩水和剤）

適用病害と使用方法

2024年2月28日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数	
すいか	うどんこ病 菌核病 炭疽病 つる枯病	1000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	4回以内	散布	4回以内	
メロン	うどんこ病 菌核病 つる枯病				5回以内		5回以内	
トマト	うどんこ病 すすかび病 灰色かび病 葉かび病				3回以内		3回以内	
ミニトマト	うどんこ病 すすかび病 灰色かび病 葉かび病 斑点病				2回以内		2回以内	
なす	うどんこ病 褐紋病 黒枯病 すすかび病 灰色かび病	2000倍	1.6L/10a	収穫前日まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内	
キャベツ	菌核病	1000倍			収穫28日前まで		5回以内	5回以内
レタス					収穫14日前まで			
アスパラガス	褐斑病 斑点病 斑点病	8倍			収穫開始7日前まで			


適用拡大登録月日：2024年02月28日

ベルコートフロアブル（イミノクタジンアルベシル酸塩水和剤）

適用病害と使用方法

2024年2月28日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数
アスパラガス	斑点病	8倍	1.6L/10a	収穫開始7日前まで	5回以内	無人航空機による散布	5回以内
いちご	うどんこ病	2000～4000倍	100～300L/10a	収穫前日まで（生育期）		無人航空機による散布	10回以内（但し、育苗期は5回以内、本圃では5回以内）
	うどんこ病 炭疽病 輪斑病	1000倍		育苗期（定植前）			
	黒斑病 炭疽病 灰色かび病	2000倍		収穫前日まで（生育期）			
やまのいも（むかご）	青かび病	200倍	-	植付前	1回	1～10分間種いも浸漬	1回
かんきつ（みかんを除く）	そうか病 貯蔵病害（軸腐病） 幹腐病	1000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
	貯蔵病害（青かび病） 貯蔵病害（緑かび病） 貯蔵病害（黒腐病） 灰色かび病	1000～2000倍					
	貯蔵病害（青かび病） 貯蔵病害（緑かび病） 灰色かび病	20倍	8～10L/10a			無人航空機による散布	

 適用拡大登録月日：2024年02月28日

ベルコートフロアブル（イミノクタジンアルベシル酸塩水和剤）

適用病害と使用方法

2024年2月28日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数
かんきつ(みかんを除く)	貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病) 灰色かび病	20倍	8~10L/10a	収穫前日まで	2回以内	無人航空機による散布	2回以内
		10倍	4~5L/10a				
みかん	そうか病 貯蔵病害(軸腐病)	1000倍	200~700L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病) 貯蔵病害(黒腐病) 灰色かび病	1000~2000倍					
	貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病) 灰色かび病	10倍	4~5L/10a		無人航空機による散布		
		20倍	8~10L/10a				
なし	うどんこ病 黒星病 黒斑病 輪紋病	1500倍	200~700L/10a	収穫14日前まで	5回以内	散布	5回以内(但し、塗布剤は2回以内、液剤は1回以内)
				収穫前日まで	6回以内(但し、開花期以降散布は3回以内)		
りんご	褐斑病 黒星病 すす点病 すす斑病 斑点落葉病 輪紋病	1000~1500倍					8回以内(但し、液剤及び水和剤は合計6回以内(開花期以降は3回以内)、塗布剤は2回以内)

適用拡大登録月日：2024年02月28日

ベルコートフロアブル（イミノクタジンアルベシル酸塩水和剤）

適用病害と使用方法

2024年2月28日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数
りんご	褐斑病 黒星病 すす点病 すす斑病 斑点落葉病 輪紋病	1000～1500倍	200～700L/10a	収穫前日まで	6回以内(但し、開花期以降散布は3回以内)	散布	8回以内(但し、液剤及び水和剤は合計6回以内(開花期以降は3回以内)、塗布剤は2回以内)
	黒点病	1000倍					
おうとう	灰星病	1000～2000倍		収穫7日前まで	3回以内		3回以内
もも	黒星病 灰星病 根腐敗病			収穫前日まで			3回以内(但し、休眠期は1回以内)
初刈り		1500～2000倍			2回以内		2回以内
小粒核果類(うめ、すももを除く)	灰星病	2000倍		収穫30日前まで	3回以内		3回以内
うめ	黒星病 すす斑病 灰色かび病						
すもも	灰星病			収穫3日前まで			
くり	実炭疽病	1000倍		収穫14日前まで	2回以内		2回以内
アリス	青かび病	100倍	-	植付前	1回	10分間球根浸漬 30分間球根浸漬	8回以内
		200倍					
フェーリップ	褐色斑点病 灰色かび病	1000倍	100～300L/10a	発病前～発病初期	8回以内	散布	


適用拡大登録月日：2024年02月28日

ベルコートフロアブル（イミノクタジナルベシル酸塩水和剤）

適用病害と使用方法

2024年2月28日現在


作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数
チューリップ°	褐色斑点病 灰色かび病	1000倍	100～300L/10a	発病前～発病初期	8回以内	散布	8回以内
茶	新梢枯死症 炭疽病 輪斑病	1500～2000倍	200～400L/10a	摘採7日前まで	2回以内		2回以内

 適用拡大登録月日：2024年02月28日

ベルコートフロアブル（イミノクタジンアルベシル酸塩水和剤）

2024年2月28日現在

作物名	適用場所	適用病害虫	使用液量	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンアルベシル酸塩を含む農薬の総使用回数
きゅうり	温室、ガラス室、ビニールハウス等の密閉できる場所	うどんこ病 褐斑病 菌核病 黒星病 炭疽病 灰色かび病	10L/10a	150mL/10a	収穫前日まで	7回以内	常温煙霧	7回以内
なす		うどんこ病 褐紋病 黒枯病 すすかび病 灰色かび病				3回以内		3回以内

 適用拡大登録月日：2024年02月28日