

# ペンコゼブ水和剤（マンゼブ水和剤）

適用病害虫と使用方法

2023年12月20日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンゼブを含む農薬の総使用回数
さといも	疫病	500倍	100～300L/1	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
ばれいしょ	疫病 夏疫病	400～600倍	0a		10回以内		10回以内(但し、無人航空機散布は3回以内)
	疫病	100倍	25L/10a				
やまのいも	炭疽病 葉決病	400～600倍	100～300L/1 0a	収穫21日前まで	4回以内	4回以内	
てんさい	褐斑病				5回以内		5回以内
		125倍	25L/10a				
にんじん	黒葉枯病	400倍	100～300L/1 0a	収穫7日前まで	3回以内	3回以内	
たまねぎ	黒斑病 灰色かび病 べと病	400～600倍		収穫3日前まで	5回以内		5回以内
にんにく	葉枯病			収穫7日前まで			
ねぎ	黒斑病 さび病 べと病	600倍		収穫14日前まで	3回以内	3回以内	
だいず	紫斑病 べと病	400倍		収穫45日前まで			
きゅうり	褐斑病 黒星病 炭疽病	600倍		収穫前日まで			
	べと病		600～800倍				
かぼちゃ	疫病 べと病	600倍		収穫21日前まで	2回以内	2回以内	
すいか	褐色腐敗病		400～600倍		収穫7日前まで		7回以内
	炭疽病 つる枯病						
メロン	つる枯病 べと病				5回以内	5回以内	

適用拡大登録月日：2023年12月20日

# ペンコゼブ水和剤（マンゼブ水和剤）

適用病害虫と使用方法

2023年12月20日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンゼブを含む農薬の総使用回数		
トマト	疫病 葉かび病	800倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内		
キャベツ	べと病	400～600倍		収穫30日前まで	3回以内		3回以内		
はくさい	黒斑病 白斑病 べと病	600倍		1回	1回				
アスパラガス(露地栽培)	褐斑病 茎枯病 斑点病	500倍		収穫終了後(但し、秋期まで)	6回以内		6回以内		
いちご	炭疽病	600倍	200～700L/10a	仮植栽培期(但し、収穫76日前まで)	4回以内		4回以内		
かんきつ(みかんを除く)	汚れ果症 褐色腐敗病 そばかす病 炭疽病 チャノキアザミマ			4回以内				4回以内	4回以内
	黒点病 小黒点病	600～800倍							
	ミカンビダニ	1000倍							
みかん	褐色腐敗病 そばかす病 チャノキアザミマ	400～600倍	200～700L/10a	収穫30日前まで	4回以内		4回以内		
	黒点病	400～800倍							
	小黒点病	600～800倍							
	そうか病	400倍							
	炭疽病	600倍							
	ミカンビダニ	1000倍							
なし	赤星病 黒星病	400～600倍			5回以内	5回以内			

適用拡大登録月日：2023年12月20日

# ペンコゼブ水和剤（マンゼブ水和剤）

適用病害虫と使用方法

2023年12月20日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンゼブを含む農薬の総使用回数
なし	黒斑病 輪紋病	600倍	200～700L/10a	収穫30日前まで	5回以内	散布	5回以内
りんご	赤星病 褐斑病 黒星病 黒点病 すす点病 すす斑病 炭疽病 斑点落葉病	500～600倍			3回以内		3回以内
	輪紋病	500倍					
びわ	たてぼや病	600倍		落弁期まで	2回以内		2回以内
おうとう	灰星病			収穫21日前まで			
もも	黒星病 せん孔細菌病 果実赤点病			3回以内	3回以内		
ぶどう	晩腐病 褐斑病 黒とう病 さび病 べと病	1000倍		収穫45日前まで	2回以内		2回以内
マンゴー	炭疽病	800倍					
オレンジ		600倍		収穫90日前まで			
さんしょう(果実)		さび病		最終収穫後～落葉期まで	3回以内		3回以内
かき	うどんこ病	400倍	収穫45日前まで	2回以内	2回以内		
	炭疽病 落葉病	400～800倍					


適用拡大登録月日：2023年12月20日

# ペンコゼブ水和剤（マンゼブ水和剤）

適用病害虫と使用方法

2023年12月20日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンゼブを含む農薬の総使用回数
樹木類	炭疽病 斑点症(シュート・サ・コスホラ菌)	600倍	200～700L/10a	発病初期	4回以内	散布	4回以内
	枝枯細菌病			新梢伸長期～発病初期			

 適用拡大登録月日：2023年12月20日