

ペンコゼブフロアブル（マンゼブ水和剤）

適用病害と使用方法

2022年8月3日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンゼブを含む農薬の総使用回数
ねぎ	黒斑病 さび病 べと病	500～600倍	150～300L/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
さやえんどう	褐斑病 褐紋病	500倍	100～300L/10a	収穫開始30日前まで	2回以内		2回以内
実えんどう				収穫14日前まで			
きゅうり	褐斑病	500～1000倍	150～300L/10a	収穫前日まで	3回以内		3回以内
	炭疽病 べと病						
すいか	炭疽病 つる枯病	600倍		収穫7日前まで	7回以内		7回以内
メロン	つる枯病	500倍		5回以内	5回以内		
	べと病	500～600倍					
トマト ミニトマト	疫病 すすかび病 葉かび病 輪紋病	1000倍		収穫前日まで	2回以内		2回以内
キャベツ	べと病	500～600倍		収穫30日前まで	3回以内		3回以内
うめ	かいよう病 黒星病 すす斑病	1000倍	200～700L/10a	収穫21日前まで			

ペンコゼブフロアブル（マンゼブ水和剤）

適用病害と使用方法

2022年8月3日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンゼブを含む農薬の総使用回数
ぶどう	晩腐病 褐斑病 黒とう病 べと病	1000倍	200～700L/10a	収穫45日前まで	2回以内	散布	2回以内
きく	白さび病	800倍	100～300L/10a	発病前～発病初期	8回以内		8回以内