

# ピラニカEW (テブフェンピラド乳剤)

適用害虫と使用方法

2023年8月2日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	テブフェンピラドを含む農薬の総使用回数		
さといも	カンザワハダニ	2000倍	150～300L/10a	収穫前日まで	1回	散布	1回		
あずき	ハダニ類	1000～2000倍		収穫7日前まで					
きゅうり	アブラムシ類	2000倍		収穫前日まで					
	ハダニ類	2000～3000倍		収穫3日前まで					
すいか メロン	チャノホコリダニ			2000倍				収穫前日まで	
なす		2000倍	2回以内	2回以内					
いちご	うどんこ病 アブラムシ類	2000～3000倍			1回	1回			
	ハダニ類								
おうとう	アブラムシ類 ハダニ類	1000～2000倍	200～700L/10a	収穫30日前まで	1回		1回		
もも		1000～2000倍		収穫14日前まで					
花き類・観葉植物(カーネーション、きくを除く)		2000倍	150～300L/10a	発生初期					
カーネーション		1000～2000倍							
きく		アブラムシ類	1000倍	200～700L/10a				2回以内	
		ハダニ類	1000～2000倍						
ほおずき		チャノホコリダニ	2000倍	200～700L/10a				2回以内	
しきみ		サビダニ類	1000倍						
やなぎ		ハダニ類	2000倍	150～300L/10a				1回	1回
茶		コミカンアブラムシ チャノミドリヒメヨコバイ	1000倍	200～400L/10a				摘採21日前まで	
	カンザワハダニ	1000～2000倍							