

バイゲットプリンスリンバーL粒剤（フィプロニル・チアジニル・フラメトピル粒剤）

適用病害虫と使用方法

2022年7月20日現在

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フィプロニルを含む農薬の総使用回数	チアジニルを含む農薬の総使用回数	フラメトピルを含む農薬の総使用回数
稲(箱育苗)	いもち病 白葉枯病 紋枯病 ウカ類 イネスズウムシ イネトコイムシ コブノメイガ ニカメイトウ イネツトムシ	育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当り50g	緑化期～移植当日	1回	本剤の所定量を育苗箱中の苗の上から均一に散布する	1回	3回以内（但し、移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内）	2回以内（但し、移植時までの処理は1回以内）
		高密度には種する場合は1kg/10a（育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当り50～100g）						
	内穎褐変病	育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a（育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当り50～100g）	移植当日					

バイゲットプリンスリンバーL粒剤（フィプロニル・チアジニル・フラメトピル粒剤）

適用病害虫と使用方法

2022年7月20日現在

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フィプロニルを含む農薬の総使用回数	チアジニルを含む農薬の総使用回数	フラメトピルを含む農薬の総使用回数
稲(箱育苗)	内穎褐変病	高密度には種する場合は1kg/10a (育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50～100g)	移植当日	1回	本剤の所定量を育苗箱中の苗の上から均一に散布する	1回	3回以内(但し、移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内)	2回以内(但し、移植時までの処理は1回以内)
	もみ枯細菌病	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g	移植3日前～移植当日					