

ルーチン粒剤（イソチアニル粒剤）

適用病害と使用方法

2017年12月20日現在

作物名	適用病害名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イソチアニルを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 白葉枯病 穂枯れ（ごま葉枯病菌）	1kg/10a	収穫30日前まで	2回以内	湛水散布	3回以内（但し、直播では種時又は移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内）
稲(箱育苗)	いもち病 白葉枯病 内穎褐変病 穂枯れ（ごま葉枯病菌） もみ枯細菌病	育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当り50g	は種時（覆土前）～移植当日	1回	育苗箱の上から均一に散布する	3回以内（但し、移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内）
	いもち病 白葉枯病 苗立枯細菌病 もみ枯細菌病		は種前		育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する	
	苗立枯細菌病 苗腐敗症（もみ枯細菌病菌）		は種時（覆土前）		育苗箱の上から均一に散布する	
	苗腐敗症（もみ枯細菌病菌）		は種前		育苗箱の床土に均一に混和する	
	穂枯れ（ごま葉枯病菌）				育苗箱の覆土に均一に混和する	