

トルネードエースDF（インドキサカルブ水和剤）

適用害虫と使用方法

2024年8月28日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	インドキサカルブ及びインドキサカルブMPを含む農薬の総使用回数		
かんしょ	ナガジロシハバ ハスモンヨトウ	2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内		
		20倍	1～2L/10a			無人航空機による散布			
さといも	ハスモンヨトウ	2000倍	100～300L/10a			20倍		1～2L/10a	散布
		20倍	1～2L/10a					無人航空機による散布	
しょうが	アノメイガ ハスモンヨトウ	2000倍	100～300L/10a		20倍	1～2L/10a	3回以内	散布	3回以内
		20倍	1～2L/10a			無人航空機による散布			
だいこん	コナガ カブラハバチ類 ハイマダラノメイガ ヨトウムシ アムシ	2000倍	100～300L/10a		20倍	1～2L/10a	2回以内	散布	2回以内
		20倍	1～2L/10a			無人航空機による散布			
ねぎ	シロイモリヨトウ	1000倍	100～300L/10a	10倍	1～2L/10a	収穫14日前まで	散布		
		10倍	1～2L/10a		無人航空機による散布				
だいず	ハスモンヨトウ	2000倍	100～300L/10a	8～16倍	800mL/10a	収穫7日前まで	散布		
		8～16倍	800mL/10a		無人航空機による散布				
えだまめ		2000倍	100～300L/10a			散布			
トマト	オオカバコガ ハスモンヨトウ トマトキバガ					収穫前日まで			

適用拡大登録月日：2024年08月28日

トルネードエースDF（インドキサカルブ水和剤）

適用害虫と使用方法

2024年8月28日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	インドキサカルブ及びインドキサカルブMPを含む農薬の総使用回数
トマト	オオタバコガ ハスモンヨトウ トマトキバガ	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
なす	テントウムシダマシ類 オオタバコガ ハスモンヨトウ						
ピーマン	オオタバコガ						
ブロッコリー	ウワバ類 コナガ ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ アオムシ	20倍	1～2L/10a	収穫14日前まで	無人航空機による散布	散布	
キャベツ	ウワバ類 ハイマダラノメイガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ	2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで			
	ウワバ類 コナガ ハイマダラノメイガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ アオムシ	10倍	1～2L/10a				
	コナガ アオムシ	1000～2000倍	100～300L/10a				
はくさい	ウワバ類 カブラノミダマシ類 ハイマダラノメイガ ヨトウムシ シロイチモジヨトウ	2000倍	0a			散布	

適用拡大登録月日：2024年08月28日

トルネードエースDF（インドキサカルブ水和剤）

適用害虫と使用方法

2024年8月28日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	インドキサカルブ及びインドキサカルブMPを含む農薬の総使用回数	
はくさい	ウワバ類 カブラハバチ類 ハイマダラノメイガ ヨトウムシ シロイモジヨトウ	2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内	
	ウワバ類 コナガ カブラハバチ類 ハイマダラノメイガ ヨトウムシ シロイモジヨトウ アオムシ	10倍	1～2L/10a					無人航空機による散布
	コナガ アオムシ	1000～2000倍	100～300L/10a					散布
レタス	ウワバ類 オオタバコガ ヨトウムシ	2000倍 20倍	100～300L/10a 1～2L/10a	収穫前日まで	4回以内	散布	4回以内	
非結球レタス	ハスモンヨトウ シロイモジヨトウ	2000倍 20倍	100～300L/10a 1～2L/10a					無人航空機による散布
	オオタバコガ ハスモンヨトウ	2000倍	100～300L/10a					散布
いちご	オオタバコガ ハスモンヨトウ	2000倍	100～300L/10a	発生初期	4回以内	散布	4回以内	
きく	オオタバコガ ハスモンヨトウ シロイモジヨトウ							
樹木類(さくらを除く)	ケムシ類	4000倍	200～700L/10a					

適用拡大登録月日：2024年08月28日

トルネードエースDF（インドキサカルブ水和剤）

適用害虫と使用方法

2024年8月28日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	インドキサカルブ及びインドキサカルブMPを含む農薬の総使用回数
さくら	クビアカツヤカミキリ	1000倍	200～500L/10a	成虫発生初期	4回以内	散布	4回以内
	ケムシ類	4000倍	200～700L/10a	発生初期			
たばこ	タバココブアザミウマ ヨトウムシ	2000倍	100～180L/10a	収穫10日前まで	1回		1回

 適用拡大登録月日：2024年08月28日