

トルネードエースDF (インドキサカルブ水和剤)

適用害虫と使用方法

2020年8月12日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	インドキサカルブ及びインドキサカルブMPを含む農薬の総使用回数
かんしょ	ナジロシタバ ハスモンヨトウ	2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
さといも	ハスモンヨトウ						
しょうが	アヲノメイガ ハスモンヨトウ				3回以内		
だいこん	コナガ カヅラハバチ ハイマダノメイガ ヨトウムシ アトムシ			収穫21日前まで	2回以内		
ねぎ	シロイモシヨトウ	1000倍		収穫14日前まで		無人航空機による散布	
だいず	ハスモンヨトウ	2000倍		収穫7日前まで			
		8～16倍	800ml/10a				
えだまめ		2000倍	100～300L/10a			散布	
トマト	オオタバコガ ハスモンヨトウ			収穫前日まで			
なす	テントウムシダマシ類 オオタバコガ ハスモンヨトウ						
ピーマン	オオタバコガ						
ブロッコリー	コナガ アトムシ			収穫14日前まで			
キャベツ	タマキソウワバ ハイマダノメイガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ			収穫7日前まで			

トルネードエースDF (インドキサカルブ水和剤)

適用害虫と使用方法

2020年8月12日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	インドキサカルブ及びインドキサカルブMPを含む農薬の総使用回数
キャベツ はくさい	コガ アオムシ	1000～2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
はくさい	カブラハバチ ハイマダラノメイガ ヨトウムシ	2000倍		収穫前日まで			
レタス 非結球レタス	オオタバコガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ			発生初期			
いちご	オオタバコガ ハスモンヨトウ			収穫10日前まで	1回		
きく	ハスモンヨトウ			100～180L/10a	1回		
たばこ	タバコアオムシ ヨトウムシ						