

ジョイスターLフロアブル（カフェンストロール・シハロホップブチル・ダイムロン・ベンスルフロ

適用雑草と使用方法

2007年8月15日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	カフェンストロールを含む農薬の総使用回数	シハロホップブチルを含む農薬の総使用回数	ダイムロンを含む農薬の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 ウリカ オモダカ(北陸、九州) クグワイ(北陸を除く) コキヤガラ(九州) セリ ヒルムシロ ヘラオモダカ(北陸) ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ アオシロ・藻類による表層はく離	移植後3日～ル ³ I3葉期(但し、移植後30日まで)	砂壤土～埴土	500ml/10a	1回	原液湛水散布又は水口施用	全域(北海道、東北を除く)の普通期及び早期栽培地帯	1回	3回以内	3回以内(但し、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内)	2回以内

ジョイスターLフロアブル（カフェンストロール・シハロホップブチル・ダイムロン・ベンスルフロ

適用雑草と使用方法

2007年8月15日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	カフェンストロールを含む農薬の総使用回数	シハロホップブチルを含む農薬の総使用回数	ダイムロンを含む農薬の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数
移植水稻		移植後3日～13葉期（但し、移植後30日まで）	砂壤土～埴土	500ml/10a	1回	原液湛水散布又は水口施用	全域（北海道、東北を除く）の普通期及び早期栽培地帯	1回	3回以内	3回以内（但し、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内）	2回以内