

ウルフェース粒剤17（ベンスルフロンメチル・ベンチオカーブ・メフェナセット粒剤）

適用雑草と使用方法

2012年10月24日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数	ベンチオカーブを含む農薬の総使用回数	メフェナセットを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 ウリカ オトギリソウ クサギ コウキヤガラ(九州) セリ ヒルムシロ ホタルイ マツバ ミスガヤツリ アオミドロ・藻類による表層はく離	移植直後～ ルビ2葉期 (但し、移植後30日まで)	砂壤土～ 埴土(但し、移植直後～移植後4日の砂壤土は除く)	3kg/10a	1回	湛水散布	関東・東山・東海、近畿・中国・四国、九州の早期栽培地帯	2回以内	1回	2回以内

ウルフェース粒剤17（ベンスルフロンメチル・ベンチオカーブ・メフェナセット粒剤）

適用雑草と使用方法

2012年10月24日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数	ベンチオカーブを含む農薬の総使用回数	メフェナセットを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 ウリカ オモダカ クログワイ コウキガラ(九州) セリ ヒルムシロ ハラオモダカ(北陸) ホタルイ マツバ ミスガヤツリ アオシロ・藻類による表層はく離	移植直後～ ルビ2.5葉期（但し、移植後30日まで）	砂壤土～ 埴土（但し、移植直後～移植後4日の砂壤土は除く）	3kg/10a	1回	湛水散布	全域（北海道、東北を除く）の普通期栽培地帯	2回以内	1回	2回以内
直播水稻	水田一年生雑草 ウリカ セリ ヒルムシロ ホタルイ マツバ ミスガヤツリ アオシロ・藻類による表層はく離	稲1葉期～ ルビ2葉期（但し、収穫90日前まで）	壤土～ 埴土				北陸、関東・東山・東海、近畿・中国・四国		2回以内（但し、入水前は1回以内、入水後は1回以内）	