

# パワーウルフ 1 キロ粒剤 5 1 (ブロブチド・ベンスルフロンメチル・ベンチオカーブ・メフェナセット)

適用雑草と使用方法

2020年8月12日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	ブロブチドを含む農薬の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数	ベンチオカーブを含む農薬の総使用回数	メフェナセットを含む農薬の総使用回数
移植水稻	ウリカ オモダカ クダマ コウキヤガラ セリ ヒルムシロ ハラオモダカ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ 一年生雑草 アオシロ・藻類による表層はく離	移植直後～ ヒ2.5葉期 (但し、移植後30日まで)	1kg/10a	1回	湛水散布	2回以内	2回以内	1回	2回以内
		移植時			田植同時散布機で施用				
直播水稻	ウリカ セリ ヒルムシロ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ 一年生雑草 アオシロ・藻類による表層はく離	稲1葉期～ ヒ2.5葉期 (但し、収穫90日前まで)			湛水散布			2回以内 (但し、入水前は1回以内、入水後は1回以内)	

# パワーウルフ 1 キロ粒剤 5 1 (ブロモブチド・ベンスルフロンメチル・ベンチオカーブ・メフェナセット)

適用雑草と使用方法

2020年8月12日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	ブロモブチドを含む農薬の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数	ベンチオカーブを含む農薬の総使用回数	メフェナセットを含む農薬の総使用回数
直播水稻	<small>適用雑草名</small>	稲1葉期～ヒエ2.5葉期 (但し、収穫90日前まで)	1kg/10a	1回	湛水散布	2回以内	2回以内	2回以内 (但し、入水前は1回以内、入水後は1回以内)	2回以内