

# スプラサイド水和剤 (DMTP水和剤)

適用害虫と使用方法

2019年5月15日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	DMTPを含む農薬の総使用回数
すいか	ミキイロアザミウマ	1000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	5回以内	散布	5回以内
メロン				収穫3日前まで	2回以内		2回以内
ピーマン				収穫14日前まで	3回以内		3回以内
なす	オシッココジラミ ミキイロアザミウマ						
かんきつ(みかんを除く)	カイガラムシ類(ヤノネカイガラムシを除く) ヤノネカイガラムシ(幼虫～未成熟成虫) カメムシ類	1500倍	200～700L/10a	収穫90日前まで	4回以内		4回以内
みかん				収穫14日前まで			4回以内(但し、50～100倍希釈散布は2回以内)
なし(有袋栽培)	アブラムシ類 カイガラムシ類 シクイムシ類	1500～2000倍		収穫7日前まで	3回以内		3回以内
	カメムシ類 ナシヒゲガ ナシホリガ	1500倍					
なし(無袋栽培)	アブラムシ類 カイガラムシ類 シクイムシ類	1500～2000倍		収穫21日前まで	2回以内		2回以内
	カメムシ類 ナシヒゲガ ナシホリガ	1500倍					

# スプラサイド水和剤 (DMTP水和剤)

適用害虫と使用方法

2019年5月15日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	DMTPを含む農薬の総使用回数
りんご	アブラムシ類 カメムシ類 ハマキムシ類(コクモンハマキを除く) ギンモンハモグリガ リンゴワタムシ	1500倍	200～700L/10a	収穫30日前まで	2回以内	散布	2回以内
	カイガラムシ類 シンクイムシ類	1500～2000倍					
おうとう	カイガラムシ類 カメムシ類 ショウジョウバエ類	1500倍		収穫7日前まで	3回以内		3回以内
もも	カイガラムシ類 モモハモグリガ シンクイムシ類	1500～2000倍		収穫21日前まで	2回以内		4回以内(但し、200倍希釈散布は2回以内、1500～2000倍希釈散布は2回以内)
	クビアカツヤカミキリ	1500倍					
ネクタリン	カイガラムシ類 モモハモグリガ シンクイムシ類	1500～2000倍		収穫14日前まで			3回以内(但し、収穫後～発芽前は1回以内、発芽後は2回以内)
うめ	カイガラムシ類 クビアカツヤカミキリ	1500倍					2回以内

# スプラサイド水和剤 (DMTP水和剤)

適用害虫と使用方法

2019年5月15日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	DMTPを含む農薬の総使用回数
すもも	クビアカツヤカミリ シクイムシ類	1500倍	200～700L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内
ぶどう	カイガラムシ類 チャノキイロアザミウマ						2回以内（但し、休眠期は1回以内）
		ブトウネアブラムシ	500倍	10L/m <sup>2</sup>	収穫90日前まで	土壌灌注	
なつめ	カイガラムシ類	2000倍	200～700L/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	2回以内
かき	カイガラムシ類 カメムシ類 カキクダアザミウマ カキヒメヨコバイ	1500倍	100～300L/10a	収穫30日前まで			3回以内
		チャノキイロアザミウマ		1000倍			
キウイフルーツ	クワシロカイガラムシ	1500倍		収穫60日前まで			
くるみ	ケムシ類	1000倍		収穫7日前まで	2回以内		2回以内
花き類・観葉植物	オンシツコナジラミ			発生初期	6回以内		6回以内

# スプラサイド水和剤 (DMTP水和剤)

2019年5月15日現在

作物名	適用場所	適用病害虫	使用液量	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	DMTPを含む農薬の総使用回数
ぶどう	温室、ガラス室、ビニールハウス等の密閉できる場所	カイガラムシ類	9L/10a	200g/10a	収穫14日前まで	2回以内	常温煙霧	2回以内（但し、休眠期は1回以内）