

スプラサイド乳剤40 (DMTP乳剤)

適用害虫と使用方法

2020年4月8日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	DMTPの総使用回数
らっきょう	ネメチド類	2000倍	-	植付前	1回	30分間種球浸漬	1回
			3L/m ²	収穫14日前まで		株元灌注	
にら			収穫30日前まで				
かんきつ(みかんを除く)	エキヤナギアブラムシ カイガラムシ類 アカマルカイガラムシ幼虫 ミカンキジラミ ミカンコナジラミ チャノキイロアザミウマ フラバラゾウムシ ミカンバエ成虫 ツノロウムシ幼虫 ルビロウムシ幼虫	1500倍	200~700L/10a	収穫90日前まで	4回以内	散布	4回以内
	サンホセカイガラムシ幼虫 ヤノネカイガラムシ(幼虫~未成熟成虫) ゴマダラカミキリ成虫	1500~2000倍					
みかん	エキヤナギアブラムシ カイガラムシ類 アカマルカイガラムシ幼虫 ミカンコナジラミ チャノキイロアザミウマ フラバラゾウムシ ツノロウムシ幼虫 ルビロウムシ幼虫	1000~1500倍		収穫14日前まで			4回以内(但し、50~100倍希釈散布は2回以内)

スプラサイド乳剤40 (DMTP乳剤)

適用害虫と使用方法

2020年4月8日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	DMTPの総使用回数		
みかん	サンホセカイガラムシ幼虫 ヤノネカイガラムシ(幼虫～未成熟成虫)	1500～2000倍	200～700L/10a	収穫14日前まで	4回以内	散布	4回以内(但し、50～100倍希釈散布は2回以内)		
	ゴマダラカミキリ成虫	1000～2000倍							
	ミカンジラミ ミカンバエ成虫	1500倍							
びわ	ビワジラミ	1000～1500倍	100～300L/10a	開花期まで	2回以内	散布	2回以内		
おうとう	オウトウショウジヨウバエ			収穫7日前まで	3回以内		3回以内		
小粒核果類	カイガラムシ類			収穫14日前まで	2回以内		2回以内		
パインアップル	パインアップルコナカイガラムシ			収穫21日前まで	3回以内		3回以内		
マンゴー	チャノキアザミウマ	1500倍	100～300L/10a	収穫45日前まで	2回以内	散布	2回以内		
くり	カツラマルカイガラムシ	1000～2000倍		収穫前日まで					
花き類・観葉植物(フリスラメン、シクラメン、すいせん、フェリツ、ゆりを除く)	オンツツコナジラミ	1000倍	100～300L/10a	発生初期	6回以内	30分間球根浸漬 散布	6回以内		
シクラメン	オンツツコナジラミ キンケチブトゾウムシ成虫								
すいせん	キュウコンコナカイガラムシ							-	植付前
	オンツツコナジラミ ネダニ類							100～300L/10a	発生初期
フェリツ	オンツツコナジラミ	2000倍	3L/m ²		1回	株元灌注	6回以内(但し、株元灌注は1回以内)		
	ネダニ類								

スプラサイド乳剤40 (DMTP乳剤)

適用害虫と使用方法

2020年4月8日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	DMTPの総使用回数
ﾌﾟﾘﾑﾗ	オンツコナジラミ キンケチブトゾウムシ成虫	1000倍	100～300L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内
ゆり	オンツコナジラミ						6回以内（但し、球根浸漬は1回以内）
	ネグニ類	2000倍	-	植付前	1回	30分間球根浸漬	
樹木類	カイガラムシ類幼虫	1000～1500倍	200～700L/10a	発生初期	5回以内	散布	5回以内
	ケムシ類	1000倍					
庭木	フーバラゾウムシ						
いぬまき	キオビエダシヤク	1500～2000倍					
イチイ	キンケチブトゾウムシ成虫	1000倍					
げっきつ	ミカンジラミ	1500倍			6回以内		6回以内
茶	コミカンアブラムシ チャノホソガ	1000～1500倍	200～400L/10a	摘採14日前まで	1回		1回
	カイガラムシ類		1000L/10a				
	チャノキロアザミウマ コカクモンハマキ チャノミドリヒメヨコバイ	1000倍	200～400L/10a				