

# キラップフロアブル（エチプロール水和剤）

適用害虫と使用方法

2017年12月20日現在

作物名	適用場所	適用害虫名	希釈倍数	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エチプロールを含む農薬の総使用回数	
稲	-	イネコ類 イネトオイムシ	2000倍	60～200L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内(但し、は種時(直播)又は移植時までの処理は1回以内)	
		ウンカ類 カメムシ類	1000～2000倍						
		ウンカ類 カメムシ類 イネトオイムシ	500倍	25L/10a					
		ウンカ類 カメムシ類	8～16倍	0.8L/10a					空中散布 無人ヘリコプターによる散布
		イネトオイムシ	16倍						
稲(箱育苗)			100～200倍	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り0.5L	移植3日前～移植当日	1回	灌注	2回以内(但し、移植時までの処理は1回以内)	
水田作物、畑作物(休耕田)	ヨシ、キ、ススキ、セトカワ、ワグチウ等の多年生雑草が優占している休耕田	カメムシ類	2000倍	60～200L/10a	-	2回以内	散布	2回以内	
だいで	-			100～300L/10a	収穫7日前まで				
			16倍	0.8L/10a					無人ヘリコプターによる散布

適用拡大登録月日：2017年12月20日

# キラップフロアブル（エチプロール水和剤）

適用害虫と使用方法

2017年12月20日現在

作物名	適用場所	適用害虫名	希釈倍数	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エチプロールを含む農薬の総使用回数
えだまめ	-	カメムシ類	2000倍	100～300L/ 10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
かんきつ		アブラムシ類 チャノキイロアザミウマ	1000～2000倍	200～700L/ 10a	収穫21日前まで			
		カネタキ	2000倍					
りんご		アブラムシ類	1000～4000倍	200～700L/ 10a	収穫14日前まで			
		カメムシ類	2000倍					
		キンモンハモグリガ キンモンホソガ モモシクイガ	1000～2000倍					
マンゴー		チャノキイロアザミウマ	2000倍	200～700L/ 10a	収穫7日前まで			
かき		カメムシ類 アザミウマ類			200～700L/ 10a			
	茶	チャノキイロアザミウマ チャノホソガ ツマゲロアオカスミカメ			200～400L/ 10a	摘採7日前まで	1回	1回

適用拡大登録月日：2017年12月20日