

アプライフェルテラ粒剤（クロラントラニリプロール・チアジニル粒剤）

適用病害虫と使用方法

2022年7月20日現在

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロラントラニリプロールを含む農薬の総使用回数	チアジニルを含む農薬の総使用回数
稲(箱育苗)	いもち病 白葉枯病 もみ枯細菌病 イネヌズウムシ イネトオイトムシ イネヒメハモグリバエ コブノメイガ ニカメイチュウ フタホビコヤガ ツマグロヨコバイ	育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a（育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当り50～100g）	は種時覆土前	1回	本剤の所定量を育苗箱の上から均一に散布する	1回	3回以内（但し、移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内）
	いもち病	育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a（育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当り50～100g）	は種前				

アプライフェルテラ粒剤（クロラントラニリプロール・チアジニル粒剤）

適用病害虫と使用方法

2022年7月20日現在

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロラントラニリプロールを含む農薬の総使用回数	チアジニルを含む農薬の総使用回数
稲(箱育苗)	いもち病	高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50～100g)	は種前	1回	本剤の所定量を育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する	1回	3回以内(但し、移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内)
	イネヌズウムシ イネトコイムシ	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g			本剤の所定量を育苗箱の床土に均一に混和する		
		高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50～100g)					