

ファンタジスタ顆粒水和剤（ピリベンカルブ水和剤）

適用病害と使用方法

2024年2月28日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリベンカルブを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病	2000倍	60～150L/10	収穫30日前まで	1回	散布	1回
小麦	赤かび病	2000～4000倍	a	収穫14日前まで	3回以内		
	赤さび病 眼紋病	2000倍					
にんじん	うどんこ病 菌核病 黒葉枯病 斑点病	3000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで			
たまねぎ	灰色かび病 小菌核病	2000～4000倍	100～200L/10a	収穫前日まで	5回以内		5回以内(但し、定植前は1回以内)
	灰色腐敗病	2000～3000倍					
			1000～2000倍	-	定植直前	1回	5分間苗根部浸漬
にんにく	黄斑病 さび病 葉枯病 白斑葉枯病	3000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
にら	褐色葉枯病 さび病 白斑葉枯病			収穫前日まで			
ねぎ	黒斑病 さび病 葉枯病 小菌核腐敗病 小菌核病			収穫7日前まで			
豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、えんどうまめ、らっかせい、そらまめを除く)	菌核病 灰色かび病	2000倍					

適用拡大登録月日：2024年02月28日

ファンタジスタ顆粒水和剤（ピリベンカルブ水和剤）

適用病害と使用方法

2024年2月28日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリベンカルブを含む農薬の総使用回数
あずき	菌核病 さび病 炭疽病 灰色かび病	2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
いんげんまめ	菌核病 炭疽病 灰色かび病						
えんどうまめ	菌核病 さび病 灰色かび病						
そらまめ	菌核病 さび病 赤色斑点病 灰色かび病						
だいず	菌核病 灰色かび病						
	紫斑病	2000～4000倍					
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、未成熟そらまめを除く) えだまめ	菌核病 灰色かび病	2000倍		収穫前日まで			
えだまめ	紫斑病	2000～4000倍					
さやいんげん	菌核病 炭疽病 灰色かび病	2000倍					
さやえんどう	菌核病 さび病 灰色かび病						


適用拡大登録月日：2024年02月28日

ファンタジスタ顆粒水和剤（ピリベンカルブ水和剤）

適用病害と使用方法

2024年2月28日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリベンカルブを含む農薬の総使用回数
未成熟そらまめ	菌核病 さび病 赤色斑点病 灰色かび病	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
きゅうり	菌核病 灰色かび病	2000～3000倍					
トマト ミニトマト	菌核病 すすかび病 灰色かび病 葉かび病 斑点病						
なす	うどんこ病 褐色円星病 褐紋病 すすかび病 ガザリウム立枯病	2000倍	2000～3000倍	収穫3日前まで			
	褐色斑点病 菌核病 黒枯病 灰色かび病						
はなやさい類	菌核病 黒すす病	3000倍					
キャベツ	株腐病 黒斑病 根朽病	2000倍					
	菌核病 灰色かび病	2000～3000倍					

 適用拡大登録月日：2024年02月28日

ファンタジスタ顆粒水和剤（ピリベンカルブ水和剤）

適用病害と使用方法

2024年2月28日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリベンカルブを含む農薬の総使用回数		
はくさい	菌核病 黒斑病 炭疽病 白斑病	3000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内		
レタス	菌核病 灰色かび病	2000～3000倍							
	すそ枯病	2000倍							
非結球レタス	菌核病 灰色かび病	2000～3000倍		収穫14日前まで					
	すそ枯病	2000倍							
アスパラガス	褐斑病 茎枯病 斑点病	3000倍		収穫前日まで				2回以内	2回以内
くきちしゃ	灰色かび病								
いちご	炭疽病								
	灰色かび病	2000～3000倍							
枊	灰色かび病 葉すす病	2000倍							
かんきつ	黒点病 そうか病 灰色かび病	2000～4000倍	200～700L/10a	収穫14日前まで					
	炭疽病(さび果)	2000倍							
なし	褐色斑点病 炭疽病	3000倍		収穫前日まで					
	黒星病 黒斑病 心腐れ症(胴枯病菌) 輪紋病	3000～4000倍							

適用拡大登録月日：2024年02月28日

ファンタジスタ顆粒水和剤（ピリベンカルブ水和剤）

適用病害と使用方法

2024年2月28日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリベンカルブを含む農薬の総使用回数
りんご	うどんこ病 すす斑病 炭疽病	3000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	褐斑病 黒星病 黒点病 すす点病 斑点落葉病 モリア病 輪紋病	3000～4000倍					
おうとう	黒斑病 褐色せん孔病 灰星病 幼果菌核病	3000倍					
もも	うどんこ病 黒星病 灰星病 柿 ⁷ シ腐敗病						
初刈り	うどんこ病	3000倍					
	黒星病 灰星病 柿 ⁷ シ腐敗病	3000～4000倍					
小粒核果類(うめを除く)	黒星病 灰星病	3000倍			2回以内		2回以内
うめ	黒星病 すす斑病 灰色かび病 灰星病						
ぶどう	晩腐病 黒とう病 灰色かび病	3000～4000倍		収穫14日前まで	3回以内		3回以内
	さび病	3000倍					


適用拡大登録月日：2024年02月28日

ファンタジスタ顆粒水和剤（ピリベンカルブ水和剤）

適用病害と使用方法

2024年2月28日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリベンカルブを含む農薬の総使用回数
かき	うどんこ病 炭疽病 灰色かび病 落葉病	3000～4000倍	200～700L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
キウイフルーツ	すす斑病 灰色かび病	4000倍		収穫前日まで			
花き類・観葉植物（きく、トルコギキョウを除く）	灰色かび病	3000倍	100～300L/10a	発病初期	5回以内		5回以内
きく	白さび病 灰色かび病						
トルコギキョウ	灰色かび病 斑点病						
茶	褐色円星病 新梢枯死症 炭疽病 輪斑病		200～400L/10a	摘採7日前まで	1回		1回

 適用拡大登録月日：2024年02月28日