

# ファンタジスタ顆粒水和剤（ピリベンカルブ水和剤）

適用病害と使用方法

2020年11月11日現在

| 作物名  | 適用病害名                       | 希釈倍数       | 使用液量             | 使用時期     | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ピリベンカルブを含む農薬の総使用回数 |
|--|-----------------------------|------------|------------------|----------|---------|------|--------------------|
| 稲  | いもち病                        | 2000倍      | 60～150L/10       | 収穫30日前まで | 1回      | 散布   | 1回                 |
| 小麦   | 赤かび病                        | 2000～4000倍 | a                | 収穫14日前まで | 3回以内    |      | 3回以内               |
| にんじん   | うどんこ病<br>菌核病<br>黒葉枯病<br>斑点病 | 3000倍      | 100～300L/1<br>0a | 収穫3日前まで  |         |      |                    |
| たまねぎ   | 灰色かび病<br>小菌核病               | 2000～4000倍 | 100～200L/1<br>0a | 収穫前日まで   | 5回以内    |      | 5回以内               |
|  | 灰色腐敗病                       | 2000～3000倍 |                  |          |         |      |                    |
| にら   | 白斑葉枯病                       | 3000倍      | 100～300L/1<br>0a | 収穫7日前まで  | 3回以内    |      | 3回以内               |
| ねぎ   | 黒斑病<br>さび病<br>葉枯病<br>小菌核腐敗病 |            |                  |          |         |      |                    |
| 豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、えんどうまめ、らっかせい、そらまめを除く) | 菌核病<br>灰色かび病                | 2000倍      |                  |          |         |      |                    |
| あずき  | 菌核病<br>さび病<br>炭疽病<br>灰色かび病  |            |                  |          |         |      |                    |
| いんげんまめ   | 菌核病<br>炭疽病<br>灰色かび病         |            |                  |          |         |      |                    |
| えんどうまめ   | 菌核病<br>さび病<br>灰色かび病         |            |                  |          |         |      |                    |

# ファンタジスタ顆粒水和剤（ピリベンカルブ水和剤）

適用病害と使用方法

2020年11月11日現在

| 作物名   | 適用病害名                                | 希釈倍数       | 使用液量         | 使用時期    | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ピリベンカルブを含む農薬の総使用回数 |
|---|--------------------------------------|------------|--------------|---------|---------|------|--------------------|
| そらまめ  | 菌核病<br>赤色斑点病<br>灰色かび病                | 2000倍      | 100～300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内    | 散布   | 3回以内               |
| だいず   | 菌核病<br>灰色かび病                         |            |              |         |         |      |                    |
|   | 紫斑病                                  | 2000～4000倍 |              |         |         |      |                    |
| 豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、未成熟そらまめを除く)<br>えだまめ | 菌核病<br>灰色かび病                         | 2000倍      |              | 収穫前日まで  |         |      |                    |
| えだまめ  | 紫斑病                                  | 2000～4000倍 |              |         |         |      |                    |
| さやいんげん  | 菌核病<br>炭疽病<br>灰色かび病                  | 2000倍      |              |         |         |      |                    |
| さやえんどう  | 菌核病<br>さび病<br>灰色かび病                  |            |              |         |         |      |                    |
| 未成熟そらまめ   | 菌核病<br>赤色斑点病<br>灰色かび病                |            |              |         |         |      |                    |
| きゅうり  | 菌核病<br>灰色かび病                         | 2000～3000倍 |              |         |         |      |                    |
| トマト<br>ミニトマト                                      | 菌核病<br>すすかび病<br>灰色かび病<br>葉かび病<br>斑点病 |            |              |         |         |      |                    |

# ファンタジスタ顆粒水和剤（ピリベンカルブ水和剤）

適用病害と使用方法

2020年11月11日現在

| 作物名    | 適用病害名                        | 希釈倍数       | 使用液量         | 使用時期     | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ピリベンカルブを含む農薬の総使用回数 |
|--------|------------------------------|------------|--------------|----------|---------|------|--------------------|
| なす     | 褐色斑点病<br>菌核病<br>黒枯病<br>灰色かび病 | 2000～3000倍 | 100～300L/10a | 収穫前日まで   | 3回以内    | 散布   | 3回以内               |
|        | すすかび病<br>ガリウム立枯病             | 2000倍      |              |          |         |      |                    |
| ブロッコリー | 菌核病<br>黒すす病                  | 3000倍      |              | 収穫3日前まで  |         |      |                    |
| キャベツ   | 菌核病<br>灰色かび病                 | 2000～3000倍 |              |          |         |      |                    |
|        | 黒斑病<br>根朽病                   | 2000倍      |              |          |         |      |                    |
| はくさい   | 菌核病<br>炭疽病                   | 3000倍      |              |          |         |      |                    |
| レタス    | 菌核病<br>灰色かび病                 | 2000～3000倍 |              |          |         |      |                    |
|        | すそ枯病                         | 2000倍      |              |          |         |      |                    |
| 非結球レタス | 菌核病<br>灰色かび病                 | 2000～3000倍 |              | 収穫14日前まで |         |      |                    |
|        | すそ枯病                         | 2000倍      |              |          |         |      |                    |
| アスパラガス | 褐斑病<br>茎枯病<br>斑点病            | 3000倍      |              | 収穫前日まで   |         |      |                    |
| いちご    | 炭疽病                          | 2000倍      |              |          |         |      |                    |
|        | 灰色かび病                        | 2000～3000倍 |              |          |         |      |                    |
| かんきつ   | 黒点病<br>そうか病<br>灰色かび病         | 2000～4000倍 | 200～700L/10a | 収穫14日前まで |         |      |                    |

# ファンタジスタ顆粒水和剤（ピリベンカルブ水和剤）

適用病害と使用方法

2020年11月11日現在

| 作物名          | 適用病害名   | 希釈倍数       | 使用液量         | 使用時期   | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ピリベンカルブを含む農薬の総使用回数 |
|--------------|---|------------|--------------|--------|---------|------|--------------------|
| なし           | 褐色斑点病<br>炭疽病                                      | 3000倍      | 200～700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内    | 散布   | 3回以内               |
|              | 黒星病<br>黒斑病<br>心腐れ症（胴枯病菌）<br>輪紋病                   | 3000～4000倍 |              |        |         |      |                    |
| りんご          | うどんこ病<br>すす斑病<br>炭疽病                              | 3000倍      |              |        |         |      |                    |
|              | 褐斑病<br>黒星病<br>黒点病<br>すす点病<br>斑点落葉病<br>モリア病<br>輪紋病 | 3000～4000倍 |              |        |         |      |                    |
| おうとう         | 褐色せん孔病<br>灰星病<br>幼果菌核病                            | 3000倍      |              |        |         |      |                    |
| もも           | うどんこ病   |            |              |        |         |      |                    |
|              | 黒星病<br>灰星病<br>モミアゲ腐敗病                             | 3000～4000倍 |              |        |         |      |                    |
| 初刈り          | うどんこ病   | 3000倍      |              |        |         |      |                    |
|              | 黒星病<br>灰星病<br>モミアゲ腐敗病                             | 3000～4000倍 |              |        |         |      |                    |
| 小粒核果類（うめを除く） | 黒星病<br>灰星病  | 3000倍      |              |        | 2回以内    |      | 2回以内               |

# ファンタジスタ顆粒水和剤（ピリベンカルブ水和剤）

適用病害と使用方法

2020年11月11日現在

| 作物名                     | 適用病害名                        | 希釈倍数       | 使用液量         | 使用時期     | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ピリベンカルブを含む農薬の総使用回数 |
|-------------------------|------------------------------|------------|--------------|----------|---------|------|--------------------|
| うめ                      | 黒星病<br>すす斑病<br>灰色かび病<br>灰星病  | 3000倍      | 200～700L/10a | 収穫前日まで   | 2回以内    | 散布   | 2回以内               |
| ぶどう                     | 晩腐病<br>黒とう病<br>灰色かび病         | 3000～4000倍 |              | 収穫14日前まで | 3回以内    |      | 3回以内               |
|                         | さび病                          | 3000倍      |              |          |         |      |                    |
| かき                      | うどんこ病<br>炭疽病<br>灰色かび病<br>落葉病 | 3000～4000倍 |              | 収穫7日前まで  |         |      |                    |
| キウイフルーツ                 | すす斑病                         | 4000倍      | 収穫前日まで       |          |         |      |                    |
| 花き類・観葉植物(きく、トルコギキョウを除く) | 灰色かび病                        | 3000倍      | 100～300L/10a | 発病初期     | 5回以内    |      | 5回以内               |
| きく                      | 白さび病<br>灰色かび病                |            |              |          |         |      |                    |
| トルコギキョウ                 | 灰色かび病<br>斑点病                 |            |              |          |         |      |                    |
| 茶                       | 新梢枯死症<br>炭疽病<br>輪斑病          |            | 200～400L/10a | 摘採7日前まで  | 1回      |      | 1回                 |