

ツインターボ顆粒水和剤（クロチアニジン・イソチアニル水和剤）

適用病害虫と使用方法（側条施肥）

2021年10月27日現在

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロチアニジンを含む農薬の総使用回数	イソチアニルを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 イネミズウムシ イネトヨイムシ	100g/10a	移植時	1回	ハート肥料に混合し側条施肥田植機で施用する	4回以内（但し、直播では種時又は移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内）	3回以内（但し、直播では種時又は移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内）

ツインターボ顆粒水和剤（クロチアニジン・イソチアニル水和剤）

適用病害虫と使用方法（育苗箱灌注）

2021年10月27日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロチアニジンを含む農薬の総使用回数	イソチアニルを含む農薬の総使用回数
稲(箱育苗)	いもち病 イネスズメムシ イネトカイムシ	高密度には種する場合は100g/10a（育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当り5～10g（希釈倍数50～100倍））	育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当り500ml	移植3日前～移植当日	1回	灌注	4回以内（但し、移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内）	3回以内（但し、移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内）
		100倍						