

# ワンリードSP箱粒剤（クロチアニジン・スピネトラム粒剤）

適用表

2024年9月11日現在

| 作物名    | 適用害虫名  | 使用量   | 使用時期          | 本剤の使用回数 | 使用方法               | クロチアニジンを含む農薬の総使用回数                                | スピネトラムを含む農薬の総使用回数               |
|--------|--|---|---------------|---------|--------------------|---|---------------------------------|
| 稲(箱育苗) | ウカ類<br>イネザミマ<br>イネミスゾウムシ<br>イネトコイムシ<br>イネヒメハダカバエ<br>コブノメイガ<br>ニカメイチュウ<br>フタホビコヤガ<br>ツマクドコバ<br>イネツトムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g                         | は種時(覆土前)～移植当日 | 1回      | 育苗箱の上から均一に散布する。    | 4回以内(但し、移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) | 3回以内(但し、移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
|        |  | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50～100g) | は種前           |         | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する |   |                                 |
|        |  | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g                         |               |         |                    |   |                                 |
| 湛水直播水稻 | イネミスゾウムシ<br>イネトコイムシ<br>ニカメイチュウ<br>フタホビコヤガ<br>イネツトムシ  | 1kg/10a   | は種時           |         | は種同時施薬機を用いて土中施用する。 | 4回以内(但し、は種時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) | 3回以内(但し、は種時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |


適用拡大登録月日：2024年09月11日

# ワンリードSP箱粒剤（クロチアニジン・スピネトラム粒剤）

適用表

2024年9月11日現在

| 作物名    | 適用害虫名   | 使用量     | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法               | クロチアニジンを含む農薬の総使用回数                                | スピネトラムを含む農薬の総使用回数               |
|--------|---|---------|------|---------|--------------------|---|---------------------------------|
| 湛水直播水稻 | イネヌゾウムシ<br>イネトコイムシ<br>ニカメイユウ<br>フタホトコヤガ<br>イネツトムシ | 1kg/10a | は種時  | 1回      | は種同時施薬機を用いて土中施用する。 | 4回以内(但し、は種時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) | 3回以内(但し、は種時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |

 適用拡大登録月日：2024年09月11日