

ジャストフィットフロアブル（フルオピコリド・ベンチアバリカルブイソプロピル水和剤）

適用表

2021年1月13日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルオピコリドを含む農薬の総使用回数	ベンチアバリカルブイソプロピルを含む農薬の総使用回数
たまねぎ	白色疫病 べと病	3000倍	100～300L/ 10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内
	べと病	24倍	1.6L/10a			無人航空機による散布		
きゅうり	白さび病 べと病	5000倍	100～300L/ 10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内（ 但し、灌注 は1回以内 、散布は2 回以内）	3回以内（ 但し、灌注 は1回以内 、散布は2 回以内）
はくさい				収穫7日前まで				
レタス	べと病	500倍	セル成型育苗ト レイ1箱又はペ -ハ°-ポット1冊 （約30×60c m、使用土壌 約1.5～4L） 当り0.5L	収穫前日まで	2回以内	灌注	3回以内（ 但し、灌注 は1回以内 、散布は2 回以内）	3回以内（ 但し、灌注 は1回以内 、散布は2 回以内）
				定植前日～定 植当日	1回			
非結球レタス	べと病	5000倍	100～300L/ 10a	収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内（ 但し、灌注 は1回以内 、散布は2 回以内）	3回以内（ 但し、灌注 は1回以内 、散布は2 回以内）
				定植前日～定 植当日	1回	灌注		
かんきつ	褐色腐敗病	5000倍	200～700L/ 10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内
ぶどう	べと病			収穫30日前まで				