

# エバーゴルフオルテ箱粒剤（イミダクロプリド・イツチアニル・ペンフルフェン粒剤）

適用病害虫と使用方法

2021年10月27日現在

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミダクロプリドを含む農薬の総使用回数	イツチアニルを含む農薬の総使用回数	ペンフルフェンを含む農薬の総使用回数
稲(箱育苗)	いもち病 白葉枯病 紋枯病 ウカ類 イネヌズウムシ イネトオムシ ツマゲロコバエ	高密度には種する場合は1kg/10a（育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当り50～100g）	移植3日前～移植当日	1回	育苗箱の上から均一に散布する	3回以内（但し、移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内）	3回以内（但し、移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内）	1回
		育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当り50g	は種時（覆土前）～移植当日					
	いもち病 紋枯病 ウカ類 イネヌズウムシ イネトオムシ ツマゲロコバエ		は種前		育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する			
	疑似紋枯症（赤色菌核病菌） 疑似紋枯症（褐色紋枯病菌） 内穎褐変病 穂枯れ（ごま葉枯病菌） もみ枯細菌病	高密度には種する場合は1kg/10a（育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当り50～100g）	移植当日		育苗箱の上から均一に散布する			

# エバーゴルフオルテ箱粒剤（イミダクロプリド・イツチアニル・ペンフルフェン粒剤）

適用病害虫と使用方法

2021年10月27日現在

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミダクロプリドを含む農薬の総使用回数	イツチアニルを含む農薬の総使用回数	ペンフルフェンを含む農薬の総使用回数
稲(箱育苗)	疑似紋枯症（赤色菌核病菌） 疑似紋枯症（褐色紋枯病菌） 内穎褐変病 穂枯れ（ごま葉枯病菌） もみ枯細菌病	高密度には種する場合は1kg/10a（育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当り50～100g） 育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当り50g	移植当日	1回	育苗箱の上から均一に散布する	3回以内（但し、移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内）	3回以内（但し、移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内）	1回