

エクシレルSE（シアントラニリプロール水和剤）

適用害虫と使用方法

2024年11月13日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数
かんきつ	アゲハ類 ゴマダラカミキリ成虫 ミカンキジラミ ケシキスイ類 カネタキ コアオナナムゲリ ヨモギエダシャク アザミウマ類 ハマキムシ類 クワノミハムシ ミカンハモグリガ チャノミドリヒメヨコバイ ハスモンヨトウ ケムシ類 ミカンガタマムシ	5000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
		100倍	4～12L/10a	開花期まで			
かんきつ(苗木)	アゲハ類 アブラムシ類 ゴマダラカミキリ成虫 ミカンハモグリガ		30～500mL/樹(但し、130L/10aまで)	育苗期		散布	
なし	アブラムシ類	2500倍	200～700L/10a	収穫前日まで			
	ハマキムシ類 シンクイムシ類 ヒメボクトウ	2500～5000倍					
	ケムシ類	5000倍					
りんご	アブラムシ類	2500倍					
	<small>シロカミキリ シロカミキリ シロカミキリ シロカミキリ シロカミキリ シロカミキリ シロカミキリ シロカミキリ シロカミキリ シロカミキリ</small>	2500～5000倍					

適用拡大登録月日：2024年11月13日

エクシレルSE（シアントラニリプロール水和剤）

適用害虫と使用方法

2024年11月13日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数
りんご	コガネムシ類 ヨモギエダシヤク ハマキムシ類 ギンモンハモグリガ オオタバコガ キンモンホリガ シンクイムシ類 ヨトウムシ ケムシ類 ヒメボクトウ	2500～5000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
おうとう	コガネムシ類 コスカシバ アザミウマ類 ハマキムシ類 オウトウショウジヨウバエ ケムシ類	2500倍					
もも	コガネムシ類 ハマキムシ類 ケムシ類	5000倍					
	モモハモグリガ シンクイムシ類	2500～5000倍					

 適用拡大登録月日：2024年11月13日

エクシレルSE（シアントラニリプロール水和剤）

適用害虫と使用方法

2024年11月13日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数		
もも	モモハモグ リガ シンクイムシ類	2500～5000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内		
	モモチヨッキリゾ ウムシ	2500倍							
ネクタリン	コガネムシ類 ハマキムシ類 ケムシ類	5000倍							
	モモハモグ リガ シンクイムシ類	2500～5000倍							
	モモチヨッキリゾ ウムシ	2500倍							
小粒核果類(うめ、すももを除く)	ケムシ類	2500～5000倍							
うめ	モモヒメヨコバイ ケムシ類								
すもも	スモモミハチ シンクイムシ類 ケムシ類								
ぶどう	コガネムシ類 クビアカスガシバ アザミウマ類 フタテンヒメヨコバイ ケムシ類	5000倍							
	コガネムシ類 ケムシ類	100倍						4～14L/10a	無人航空機による散布
	ハスモンヨトウ	2500～5000倍						200～700L/10a	散布
ブルーベリー	アブラムシ類	2500倍							

 適用拡大登録月日：2024年11月13日

エクシレルSE（シアントラニリプロール水和剤）

適用害虫と使用方法

2024年11月13日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数
ブルーベリー	オウトウショウジ ヨウバエ ケムシ類	5000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
マンゴー	アザミウマ類	2000倍		収穫7日前まで	2回以内		2回以内
いちじく		2500倍		収穫14日前まで			
茶	コミカンアブラムシ ヨモギエダシヤク チャノキイロアザミウマ チャノコカクモンハマキ チャハマキ マダラカサハラハムシ チャノミドリヒメヨコバイ チャノホソガ ハスモンヨトウ	2000倍	200～400L/10a	摘採7日前まで	1回		1回

 適用拡大登録月日：2024年11月13日