

エクシレルSE（シアントラニリプロール水和剤）

適用害虫と使用方法

2020年6月24日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数
かんきつ	アゲハ類 ゴマダラカミキリ成虫 ミカンジラミ ケシスイ類 コアオハナムグリ ヨモギエダシヤク アザミウマ類 ハマキムシ類 ミカンハモグリガ チャノミドリヒメヨコバイ ハスモンヨトウ ケムシ類	5000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
かんきつ(苗木)	アゲハ類 アブラムシ類 ゴマダラカミキリ成虫 ミカンハモグリガ	100倍	30～500mL/樹 (但し、130L/10aまで)	育苗期			
なし	アブラムシ類	2500倍	200～700L/10a	収穫前日まで			
	ハマキムシ類 シンクイムシ類 ヒメボクトウ	2500～5000倍					
	ケムシ類	5000倍					
りんご	マメコガネ ヨモギエダシヤク キンモンハモグリガ オオタバコガ キンモンホリガ ケムシ類	2500～5000倍					
	ハマキムシ類 シンクイムシ類 ヒメボクトウ						

エクシレルSE（シアントラニリプロール水和剤）

適用害虫と使用方法

2020年6月24日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数
おうとう	マメコガネ コスカシバ アザミウマ類 ハマキムシ類 オウトウショウジ ヨウバエ ケムシ類	2500倍	200～700L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
もも	ハマキムシ類 ケムシ類	5000倍					
	モモハモク リガ シンクイムシ類	2500～5000倍					
ネクタリン	ハマキムシ類 ケムシ類	5000倍					
	モモハモク リガ シンクイムシ類	2500～5000倍					
小粒核果類(すももを除く)	ケムシ類						
すもも	シンクイムシ類 ケムシ類						
ぶどう	コガネムシ類 アザミウマ類 ケムシ類	5000倍					
	ハスモンヨトウ	2500～5000倍					
ブルーベリー	アブラムシ類	2500倍					
	オウトウショウジ ヨウバエ ケムシ類	5000倍					

エクシレルSE（シアントラニリプロール水和剤）

適用害虫と使用方法

2020年6月24日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数
茶	ヨモギエダシヤク チャノキイロアザミウマ チャノコカクモンハマキ チャハマキ マダラカサハラハムシ チャノミドリヒメヨコバエ チャノホソガ ハスモンヨトウ	2000倍	200～400L/10a	摘採7日前まで	1回	散布	1回