ベリマークＳＣ（シアントラニリプロール水和剤）

適用害虫と使用方法　　2025年1月15日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ｼｱﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙを含む農薬の総使用回数
ねぎ	ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類 ﾈｷﾘﾑｼ類 ﾈｷﾞｺｶﾞ ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ ﾀﾏﾈｷﾞﾊﾞｴ ﾀﾈﾊﾞｴ	400倍	ｾﾙ成型育苗ﾄﾚｲ1箱又はﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾟｯﾄ1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5～4L)当り0.5L	育苗期後半～定植当日	1回	灌注	4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内(但し、株元灌注は1回以内))
	ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類 ﾈｷﾘﾑｼ類 ﾈｷﾞｺｶﾞ ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ	2000倍	0.5L/平方ﾒｰﾄﾙ	収穫7日前まで	1　回	株元灌注	
ﾄﾏﾄ	ｺﾅｼﾞﾗﾐ類	200倍	ｾﾙ成型育苗ﾄﾚｲ1箱又はﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾟｯﾄ1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5～4L)当り0.5L	育苗期後半～定植当日	1回	灌注	5回以内(但し、定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の株元灌注は1回以内、定植後の散布は3回以内)
		10000倍	1～3L/平方ﾒｰﾄﾙ	定植14日後まで	1　回	株元灌注	
ﾐﾆﾄﾏﾄ		200倍	ｾﾙ成型育苗ﾄﾚｲ1箱又はﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾟｯﾄ1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5～4L)当り0.5L	育苗期後半～定植当日	1回	灌注	

適用拡大登録月日：2025年01月15日

ベリマークＳＣ（シアントラニリプロール水和剤）

適用害虫と使用方法　　2025年1月15日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ｼｱﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙを含む農薬の総使用回数
ﾐﾆﾄﾏﾄ	ｺﾅｼﾞﾗﾐ類	200倍	ｾﾙ成型育苗ﾄﾚｲ1箱又はﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾟｯﾄ1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5～4L)当り0.5L	育苗期後半～定植当日	1回	灌注	5回以内(但し、定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の株元灌注は1回以内、定植後の散布は3回以内)
		10000倍	1～3L/平方ﾒｰﾄﾙ	定植14日後まで	1　回	株元灌注	
ｶﾘﾌﾗﾜｰ	ｺﾅｶﾞ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ ｱｵﾑｼ	400倍	ｾﾙ成型育苗ﾄﾚｲ1箱又はﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾟｯﾄ1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5～4L)当り0.5L	育苗期後半～定植当日	1回	灌注	1回
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｺﾅｶﾞ ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ ｱｵﾑｼ						4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内)

適用拡大登録月日：2025年01月15日

ベリマークＳＣ（シアントラニリプロール水和剤）

適用害虫と使用方法　　2025年1月15日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ｼｱﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙを含む農薬の総使用回数
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ	ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ	400倍	ｾﾙ成型育苗ﾄﾚｲ1箱又はﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾟｯﾄ1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5～4L)当り0.5L	は種覆土後～定植当日	1回	灌注	4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内)
非結球あぶらな科葉菜類(ｹｰﾙを除く)	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｺﾅｶﾞ ｱｵﾑｼ	4000倍	0.2L/平方ﾒｰﾄﾙ	収穫7日前まで			1回
ｹｰﾙ							2回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は1回以内)
	ﾈｷﾘﾑｼ類	400倍	ｾﾙ成型育苗ﾄﾚｲ1箱又はﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾟｯﾄ1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5～4L)当り0.5L	定植当日			
ｷｬﾍﾞﾂ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｳﾜﾊﾞ類 ｺﾅｶﾞ ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ｷｽｼﾞﾉﾐﾊﾑｼ ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ ﾈｷﾘﾑｼ類 ﾖﾄｳﾑｼ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ ｱｵﾑｼ			育苗期後半～定植当日			4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内)

適用拡大登録月日：2025年01月15日

ベリマークＳＣ（シアントラニリプロール水和剤）

適用害虫と使用方法　　2025年1月15日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ｼｱﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙを含む農薬の総使用回数
はくさい	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｺﾅｶﾞ ｶﾌﾞﾗﾊﾊﾞﾁ類 ｷｽｼﾞﾉﾐﾊﾑｼ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ ｱｵﾑｼ	400倍	ｾﾙ成型育苗ﾄﾚｲ1箱又はﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾟｯﾄ1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5～4L)当り0.5L	育苗期後半～定植当日	1回	灌注	4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内)
	ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ			は種覆土後～定植当日			
ﾚﾀｽ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｳﾜﾊﾞ類 ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類 ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ ﾋﾒﾌﾀﾃﾝﾖｺﾊﾞｲ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ			育苗期後半～定植当日			
	ｺｵﾛｷﾞ類			定植当日			
非結球ﾚﾀｽ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｳﾜﾊﾞ類 ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類 ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ ﾋﾒﾌﾀﾃﾝﾖｺﾊﾞｲ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ			育苗期後半～定植当日			

適用拡大登録月日：2025年01月15日

ベリマークＳＣ（シアントラニリプロール水和剤）

適用害虫と使用方法　　2025年1月15日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ｼｱﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙを含む農薬の総使用回数
非結球ﾚﾀｽ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｳﾜﾊﾞ類 ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類 ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ ﾋﾒﾌﾀﾃﾝﾖｺﾊﾞｲ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ	400倍	ｾﾙ成型育苗ﾄﾚｲ1箱又はﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾟｯﾄ1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5～4L)当り0.5L	育苗期後半～定植当日	1回	灌注	4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内)
	ｺｵﾛｷﾞ類			定植当日			
しそ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類			育苗期後半～定植当日			1回
ほうれんそう	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｼﾛｵﾋﾞﾉﾒｲｶﾞ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ	4000倍	0.2L/平方ﾒｰﾄﾙ	収穫7日前まで			
	ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ	2000倍	0.1L/平方ﾒｰﾄﾙ				
いちご	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	1000倍	25～50mL/株	育苗期後半～定植当日			4回以内(但し、定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内)
	ｺｶﾞﾈﾑｼ類 ｺﾅｼﾞﾗﾐ類 ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ ﾁﾊﾞｸﾛﾊﾞﾈｷﾉｺﾊﾞｴ		50mL/株				

適用拡大登録月日：2025年01月15日

ベリマークＳＣ（シアントラニリプロール水和剤）

適用害虫と使用方法　　2025年1月15日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ｼｱﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙを含む農薬の総使用回数
いちご	ｺｶﾞﾈﾑｼ類 ｺﾅｼﾞﾗﾐ類 ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ ﾁﾊﾞｸﾛﾊﾞﾈｷﾉｺﾊﾞｴ	1000倍	50mL/株	育苗期後半～定植当日	1回	灌注	4回以内(但し、定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内)
	ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ		25～50mL/株	育苗期後半			
		10000倍	500mL/株	定植直後		株元灌注	

適用拡大登録月日：2025年01月15日

ベリマークＳＣ（シアントラニリプロール水和剤）

適用表　　2025年1月15日現在

作物名	適用病害虫名	使用量 希釈水量	使用量 薬量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ｼｱﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙを含む農薬の総使用回数
きゅうり	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	400株当り2～20L(1株当り5～50mL)	400株当り25mL	育苗期後半～定植当日	1回	灌注	4回以内(但し、定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内)
		400株当り20～200L(1株当り50～500mL)		定植直後		株元灌注	
	ｺﾅｼﾞﾗﾐ類 ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類	400株当り10～20L(1株当り25～50mL)		育苗期後半～定植当日		灌注	
	ｱｻﾞﾐｳﾏ類	400株当り20L(1株当り50mL)		定植直後		株元灌注	
すいか	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｺﾅｼﾞﾗﾐ類 ｱｻﾞﾐｳﾏ類	400株当り10～20L(1株当り25～50mL)		育苗期後半～定植当日		灌注	1回
	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	400株当り20～200L(1株当り50～500mL)		定植直後		株元灌注	
ﾒﾛﾝ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｺﾅｼﾞﾗﾐ類 ｱｻﾞﾐｳﾏ類	400株当り10～20L(1株当り25～50mL)		育苗期後半～定植当日		灌注	

適用拡大登録月日：2025年01月15日

ベリマークＳＣ（シアントラニリプロール水和剤）

適用表　　2025年1月15日現在

作物名	適用病害虫名	使用量 希釈水量	使用量 薬量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ｼｱﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙを含む農薬の総使用回数
ﾒﾛﾝ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｺﾅｼﾞﾗﾐ類 ｱｻﾞﾐｳﾏ類	400株当り10～20L(1株当り25～50mL)	400株当り25mL	育苗期後半～定植当日	1回	灌注	1回
	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	400株当り20～200L(1株当り50～500mL)		定植直後		株元灌注	
ﾄﾏﾄ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｺﾅｼﾞﾗﾐ類 ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類 ﾄﾏﾄｷﾊﾞｶﾞ	400株当り10～20L(1株当り25～50mL)		育苗期後半～定植当日		灌注	5回以内(但し、定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の株元灌注は1回以内、定植後の散布は3回以内)
	ｺﾅｼﾞﾗﾐ類	400株当り20～200L(1株当り50～500mL)		定植直後	1　回	株元灌注	
ﾐﾆﾄﾏﾄ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｺﾅｼﾞﾗﾐ類 ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類 ﾄﾏﾄｷﾊﾞｶﾞ	400株当り10～20L(1株当り25～50mL)		育苗期後半～定植当日	1回	灌注	
	ｺﾅｼﾞﾗﾐ類	400株当り20～200L(1株当り50～500mL)		定植直後	1　回	株元灌注	

適用拡大登録月日：2025年01月15日

ベリマークＳＣ（シアントラニリプロール水和剤）

適用表　　2025年1月15日現在

作物名	適用病害虫名	使用量 希釈水量	使用量 薬量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ｼｱﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙを含む農薬の総使用回数
ﾐﾆﾄﾏﾄ	ｺﾅｼﾞﾗﾐ類	400株当り20～200L(1株当り50～500mL)	400株当り25mL	定植直後	1　回	株元灌注	5回以内(但し、定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の株元灌注は1回以内、定植後の散布は3回以内)
なす	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｺﾅｼﾞﾗﾐ類 ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類 ﾈｷﾘﾑｼ類	400株当り10～20L(1株当り25～50mL)		育苗期後半～定植当日	1回	灌注	1回
	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	400株当り20～200L(1株当り50～500mL)		定植直後		株元灌注	
ﾋﾟｰﾏﾝ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｺﾅｼﾞﾗﾐ類 ｱｻﾞﾐｳﾏ類	400株当り10～20L(1株当り25～50mL)		育苗期後半～定植当日		灌注	4回以内(但し、定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内)

適用拡大登録月日：2025年01月15日

ベリマークＳＣ（シアントラニリプロール水和剤）

適用表　　2025年1月15日現在

作物名	適用病害虫名	使用量 希釈水量	使用量 薬量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ｼｱﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙを含む農薬の総使用回数
ﾋﾟｰﾏﾝ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｺﾅｼﾞﾗﾐ類 ｱｻﾞﾐｳﾏ類	400株当り10～20L(1株当り25～50mL)	400株当り25mL	育苗期後半～定植当日	1回	灌注	4回以内(但し、定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内)
	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	400株当り20～200L(1株当り50～500mL)		定植直後		株元灌注	
	ｺｶﾞﾈﾑｼ類	400株当り10L(1株当り25mL)		育苗期後半～定植当日		灌注	
ししとう	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｺﾅｼﾞﾗﾐ類 ｱｻﾞﾐｳﾏ類						4回以内(但し、灌注は1回以内、散布は3回以内)

適用拡大登録月日：2025年01月15日