

# ベリマークSC (シアントラニリプロール水和剤)

適用害虫と使用方法

2020年6月24日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数
ねぎ	アザミウマ類 ハモグリバエ類 ネキリムシ類 シロイモジヨトウ タネキバエ タネバエ	400倍	セル成型育苗トレイ1箱又はハ <sup>°</sup> -ハ <sup>°</sup> -ポット1冊 (約30×60cm、使用土壌約1.5~4L) 当り0.5L	育苗期後半~定植当日	1回	灌注	4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内(但し、株元灌注は1回以内))
	アザミウマ類 ハモグリバエ類 シロイモジヨトウ	2000倍	0.5L/m <sup>2</sup>	収穫7日前まで		株元灌注	
カリフラワー	コナガ ハスモンヨトウ アオムシ	400倍	セル成型育苗トレイ1箱又はハ <sup>°</sup> -ハ <sup>°</sup> -ポット1冊 (約30×60cm、使用土壌約1.5~4L) 当り0.5L	育苗期後半~定植当日		灌注	1回
ブロッコリー	アブラムシ類 コナガ アザミウマ類 ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ アオムシ						4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内)
非結球あぶらな科葉菜類(こまつなを除く)	アブラムシ類 コナガ アオムシ	4000倍	0.2L/m <sup>2</sup>	収穫7日前まで		株元灌注	1回

# ベリマークSC (シアントラニリプロール水和剤)

適用害虫と使用方法

2020年6月24日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数
キャベツ	アブラムシ類 ウバ類 コナガ アザミウマ類 ハイマダラノメイガ ネキリムシ類 ヨトウムシ ハスモンヨトウ アオムシ	400倍	セル成型育苗トレイ1箱又はペ-パ-ポット1冊 (約30×60cm、使用土壌約1.5~4L) 当り0.5L	育苗期後半~定植当日	1回	灌注	4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内)
はくさい	アブラムシ類 コナガ カブラハバチ ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ アオムシ						
レタス 非結球レタス	アブラムシ類 ウバ類 ハモクギリハエ類 オタバコガ ヒメフタテンヨコバエ ハスモンヨトウ						
ほうれんそう	シロビノメイガ ハスモンヨトウ	4000倍	0.2L/m <sup>2</sup>	収穫7日前まで		株元灌注	1回
いちご	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類 ハスモンヨトウ	1000倍	50mL/株	育苗期後半~定植当日		灌注	4回以内(但し、灌注は1回以内、散布は3回以内)

# ベリマークSC (シアントラニリプロール水和剤)

適用表

2020年6月24日現在

作物名	適用病害虫名	使用量 希釈水量	使用量 薬量	使用時期	本剤の使用 回数	使用方法	シアントラニプロール を含む農薬の 総使用回数
きゅうり	アブラムシ類	400株当り2 ～20L (1株 当り5～50ml )	400株当り25 ml	育苗期後半～定 植当日	1回	灌注	4回以内 (但 し、定植時 までの処理 は1回以内、 定植後の散 布は3回以内 )
	コナジラミ類 アザミウマ類 ハモグリバエ類	400株当り10 ～20L (1株 当り25～50m l)					
すいか メロン	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類						1回
トマト ミニトマト	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類 ハモグリバエ類						4回以内 (但 し、定植時 までの処理 は1回以内、 定植後の散 布は3回以内 )

# ベリマークSC（シアントラニリプロール水和剤）

適用表

2020年6月24日現在

作物名	適用病害虫名	使用量 希釈水量	使用量 薬量	使用時期	本剤の使用 回数	使用方法	シアントラニリプロール を含む農薬の 総使用回数
なす	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類 ハモグリバエ類 ネキリムシ類	400株当り10 ～20L（1株 当り25～50m l）	400株当り25 ml	育苗期後半～定 植当日	1回	灌注	1回
ピーマン	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類						4回以内（但 し、定植時 までの処理 は1回以内、 定植後の散 布は3回以内 ）
ししとう		400株当り10 L（1株当り2 5ml）					4回以内（但 し、灌注は1 回以内、散 布は3回以内 ）