

ベネビアOD (シアントラニリプロール水和剤)

適用害虫と使用方法

2021年3月10日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数
未成熟とうもろこし	ムギクビレアブラムシ	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	アワメイガ オオタバコガ ツマジロクサヨトウ	4000倍		収穫7日前まで			
かんしょ	ナカジロシタバ アリモトキゾウムシ イモゾウムシ ヨツモンカメノコハムシ ハスモンヨトウ						
	ばれいしょ	アブラムシ類 ハスモンヨトウ	2000倍 4000倍				
やまのいも	アブラムシ類 ナガイモコガ ハスモンヨトウ						
だいこん	アブラムシ類 キスジノミハムシ ハモグリバエ類	2000倍		収穫前日まで			4回以内（但し、は種時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内）
	コナガ カブラハバチ ダイコンザルハムシ ハイマダラノメイガ アオムシ	2000～4000倍					
	ヨトウムシ	4000倍					
にんじん	キアゲハ ヨトウムシ ハスモンヨトウ						3回以内
	アブラムシ類	2000倍					

ベネビアOD (シアントラニリプロール水和剤)

適用害虫と使用方法

2021年3月10日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数			
たまねぎ	アザミウマ類	2000～4000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内			
	ハモグリバエ類 ハスモンヨトウ シロイモジヨトウ	2000倍								
にんにく	アザミウマ類 ネギコガ			収穫7日前まで						
ねぎ	アザミウマ類 ハモグリバエ類 シロイモジヨトウ			収穫前日まで					4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内(但し、株元灌注は1回以内))	
だいず	アブラムシ類			収穫7日前まで					3回以内	
	マメシクイガ ハスモンヨトウ	2000～4000倍								
えだまめ	アブラムシ類	2000倍		収穫前日まで						
	マメシクイガ ハスモンヨトウ	2000～4000倍								
さやいんげん	ハモグリバエ類	2000倍								
	ハスモンヨトウ	4000倍								

ベネビアOD (シアントラニリプロール水和剤)

適用害虫と使用方法

2021年3月10日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数
きゅうり	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類 ハモグリバエ類 ウリノメイガ	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内（但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内）
	かぼちゃ						
トマト	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類 ハモグリバエ類	2000倍					4回以内（但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内）
	オオタバコガ	2000～4000倍					
ミニトマト	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類 ハモグリバエ類	2000倍					4回以内（但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内）
	オオタバコガ	2000～4000倍					
ピーマン	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類	2000倍					4回以内（但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内）
	オオタバコガ	2000～4000倍					
ししとう	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類	2000倍					4回以内（但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内）
	オオタバコガ	2000～4000倍					

ベネビアOD (シアントラニリプロール水和剤)

適用害虫と使用方法

2021年3月10日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数
ブロッコリー	アブラムシ類 アザミウマ類	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内（但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内）
	コナガ ハスモンヨトウ アオムシ	2000～4000倍					
キャベツ	アブラムシ類 アザミウマ類	2000倍					
	ウワバエ類 コナガ ハイマダラノメイガ オオタバコガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ アオムシ	2000～4000倍					
はくさい	アブラムシ類 キスジノミハムシ	2000倍					
	コナガ ハイマダラノメイガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ アオムシ	2000～4000倍					
レタス	アブラムシ類 ハモクグリハエ類	2000倍					
	オオタバコガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ	2000～4000倍					
非結球レタス	アブラムシ類 ハモクグリハエ類	2000倍					
	オオタバコガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ	2000～4000倍					

ベネビアOD (シアントラニリプロール水和剤)

適用害虫と使用方法

2021年3月10日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数	
アスパラガス	アザミウマ類	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	
	ハスモンヨトウ	4000倍						
いちご	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類	2000倍		収穫開始3日前まで			3回以内	4回以内（但し、灌漑は1回以内、散布は3回以内）
	ハスモンヨトウ	2000～4000倍						
オクラ	アブラムシ類	2000倍	収穫10日前まで	2回以内	2回以内			