

# アバンティ 1 キロ粒剤 (トリアファモン・フェンキノトリオン・フェントラザミド粒剤)

適用雑草及び使用方法

2020年8月12日現在

| 作物名  | 適用雑草名   | 使用量     | 使用時期                                     | 本剤の使用回数 | 使用方法             | トリアファモンを含む農薬の総使用回数 | フェンキノトリオンを含む農薬の総使用回数 | フェントラザミドを含む農薬の総使用回数 |
|------|---|---------|--|---------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| 移植水稻 | 一年生及び多年生雑草  | 1kg/10a | 移植直後～ル <sup>1</sup> E3.5葉期 (但し、移植後30日まで) | 1回      | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 2回以内               | 2回以内                 | 1回                  |
|      |   |         | 移植時                                      |         | 田植同時散布機で施用       |                    |                      |                     |
| 直播水稻 | ウリカ<br>セリ<br>ヒルムシロ<br>ホタルイ<br>マツハイ<br>ミスガヤツリ<br>一年生雑草 |         | 稲1葉期～ル <sup>1</sup> E3.5葉期 (但し、収穫90日前まで) |         |                  |                    |                      |                     |