

ベルーガ1キロ粒剤（ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン粒剤）

適用雑草及び使用方法

2018年12月5日現在

作物名	適用雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数	フェンキノトリオンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 ウリカ オモダカ コウキガウ セリ ヒルムシロ ハラオモダカ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ アオシロ・藻類による表層はく離	1kg/10a	移植直後～ルビエ3葉期（但し、移植後30日まで）	1回	湛水散布	2回以内	2回以内
			移植時		田植同時散布機で施用		
直播水稻	水田一年生雑草 ウリカ セリ ヒルムシロ ハラオモダカ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ アオシロ・藻類による表層はく離	0.5～1kg/10a	は種直後～ルビエ3葉期（但し、収穫75日前まで）		湛水散布		
			は種直後		ごく浅く湛水して散布		
			は種時		は種同時散布機で施用		

ベルーガ1キロ粒剤（ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン粒剤）

適用雑草及び使用方法

2018年12月5日現在

作物名	適用雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数	フェンキノトリオンを含む農薬の総使用回数
直播水稻	<small>イネ科雑草、 アザミ、 クサビ、 シロネ、 カタバネ、 アザミ、 クサビ、 シロネ、 カタバネ、 アザミ、 クサビ、 シロネ、 カタバネ</small>	0.5～1kg/10a	は種時	1回	は種同時散布機で施用	2回以内	2回以内