

# プライオリティフロアブル（トリアファモン・フェンキノトリオン水和剤）

適用雑草と使用方法

2019年12月18日現在

作物名	適用雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トリアファモンを含む農薬の総使用回数	フェンキノトリオンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	ウリカ オモダカ クログワイ コウキガハラ セリ ヒルムシロ ハラオモダカ ホタルイ マツバイ ミズガヤツリ 一年生雑草 多年生イネ科雑草 アミトロ・藻類による表層はく離	500ml/10a	移植直後～ルビエ3.5葉期（但し、移植後30日まで）	1回	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下	2回以内	2回以内
			移植時		田植同時散布機で施用		
直播水稻	ウリカ セリ ヒルムシロ ハラオモダカ ホタルイ マツバイ ミズガヤツリ 一年生雑草 アミトロ・藻類による表層はく離		は種直後～ルビエ3.5葉期（但し、収穫90日前まで）		原液湛水散布又は無人航空機による滴下		

# プライオリティフロアブル（トリアファモン・フェンキノトリオン水和剤）

適用雑草と使用方法

2019年12月18日現在

作物名	適用雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トリアファモンを含む農薬の総使用回数	フェンキノトリオンを含む農薬の総使用回数
直播水稻	<small>適用雑草名</small>	500ml/10a	は種直後～ル <sup>1</sup> 3.5葉期（但し、収穫90日前まで）	1回	原液湛水散布又は無人航空機による滴下	2回以内	2回以内