プライオリティフロアブル（トリアファモン・フェンキノトリオン水和剤）

適用雑草と使用方法　　2019年12月18日現在

作物名	適用雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ﾄﾘｱﾌｧﾓﾝを含む農薬の総使用回数	ﾌｪﾝｷﾉﾄﾘｵﾝを含む農薬の総使用回数
移植水稲	ｳﾘｶﾜ ｵﾓﾀﾞｶ ｸﾛｸﾞﾜｲ ｺｳｷﾔｶﾞﾗ ｾﾘ ﾋﾙﾑｼﾛ ﾍﾗｵﾓﾀﾞｶ ﾎﾀﾙｲ ﾏﾂﾊﾞｲ ﾐｽﾞｶﾞﾔﾂﾘ 一年生雑草 多年生ｲﾈ科雑草 ｱｵﾐﾄﾞﾛ･藻類による表層はく離	500ml/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期（但し、移植後30日まで）	1回	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下	2回以内	2回以内
			移植時		田植同時散布機で施用		
直播水稲	ｳﾘｶﾜ ｾﾘ ﾋﾙﾑｼﾛ ﾍﾗｵﾓﾀﾞｶ ﾎﾀﾙｲ ﾏﾂﾊﾞｲ ﾐｽﾞｶﾞﾔﾂﾘ 一年生雑草 ｱｵﾐﾄﾞﾛ･藻類による表層はく離		は種直後～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期（但し、収穫90日前まで）		原液湛水散布又は無人航空機による滴下		

プライオリティフロアブル（トリアファモン・フェンキノトリオン水和剤）

適用雑草と使用方法　　2019年12月18日現在

作物名	適用雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ﾄﾘｱﾌｧﾓﾝを含む農薬の総使用回数	ﾌｪﾝｷﾉﾄﾘｵﾝを含む農薬の総使用回数
直播水稲	ｺﾅｷﾞ ﾋﾒﾐｿﾊｷﾞ ｱｾﾞﾅﾙﾏﾓﾘ ｺﾅｷﾞ ﾐﾄﾞﾘｲﾄｳｸｻ 一年性雑草 ｺﾅｷﾞ ﾋﾒﾐｿﾊｷﾞによる防除に準	500ml/10a	は種直後～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期（但し、収穫90日前まで）	1回	原液湛水散布又は無人航空機による滴下	2回以内	2回以内