

# ヨーバルシードFS（テトラニリプロール水和剤）

適用害虫と使用方法

2021年4月7日現在

| 作物名          | 適用病害虫  | 希釈倍数                                       | 使用時期     | 本剤の使用回数 | 使用方法                              | テトラニプロールを含む農薬の総使用回数 |
|--------------|--|--|----------|---------|-----------------------------------|---------------------|
| 稲(乾田直播水稻を除く) | イネミスゾウムシ<br>イネトヨイムシ<br>イネヒメハモクグリハエ<br>コブノメイガ<br>ニカメイチュウ<br>フタオビコヤガ<br>イネツトムシ | 乾燥種もみ1kg<br>当り原液11ml（<br>原液55ml/10aま<br>で） | は種前（浸種前） | 1回      | 塗沫処理（種子被<br>覆剤を加用）                | 1回                  |
|              | イネミスゾウムシ<br>イネトヨイムシ<br>イネヒメハモクグリハエ<br>ニカメイチュウ<br>フタオビコヤガ<br>イネツトムシ           |  | は種前（浸種後） |         | コーティング中又はコーテ<br>ィング後の種もみに塗<br>沫処理 |                     |
| 乾田直播水稻       | イネミスゾウムシ<br>ニカメイチュウ<br>イネツトムシ  | 乾燥種もみ1kg当り<br>原液6～11ml（原液<br>55ml/10aまで）   | は種前（浸種前） |         | 塗沫処理（種子被<br>覆剤を加用）                |                     |
|              | イネミスゾウムシ<br>イネトヨイムシ<br>イネヒメハモクグリハエ<br>ニカメイチュウ<br>フタオビコヤガ<br>イネツトムシ           | 乾燥種もみ1kg<br>当り原液11ml（<br>原液55ml/10aま<br>で） | は種前（浸種後） |         | コーティング中又はコーテ<br>ィング後の種もみに塗<br>沫処理 |                     |
|              | イネトヨイムシ<br>イネヒメハモクグリハエ<br>コブノメイガ<br>フタオビコヤガ                                  |  | は種前（浸種前） |         | 塗沫処理（種子被<br>覆剤を加用）                |                     |