

トップガンGT 1キログラム剤51（ピリミノバックメチル・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル・ペ

適用雑草と使用方法

2009年9月15日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数	ブロモブチドを含む農薬の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数	ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 ウリカ オモダカ クダマ コキヤガラ(関東・東山・東海) セリ ヒルムシロ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ アオミドロ・藻類 による表層はく離	移植直後～ ル ¹ I3葉期 (但し、移植後30日まで)	砂壤土～ 埴土	1kg/10a	1回	湛水散布	全域（北海道、東北を除く）の普通期及び早期栽培地帯	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内
		移植時				田植同時散布機で施用					
直播水稻	水田一年生雑草 ウリカ セリ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ	稲1葉期～ ル ¹ I3葉期（但し、収穫90日前まで）				湛水散布	全域（北海道、東北を除く）				

トップガンGT1キロ粒剤51（ピリミノバックメチル・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル・ペ

適用雑草と使用方法

2009年9月15日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数	ブロモブチドを含む農薬の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数	ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数
直播水稻	<small>水田一年生雑草 0127 0128 0129 0130 0131 0132</small>	稲1葉期～13葉期（但し、収穫90日前まで）	砂壤土～埴土	1kg/10a	1回	湛水散布	全域（北海道、東北を除く）	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内