

ブーンゼクテラ箱粒剤（クロラントラニリプロール・トリフルメゾピリム・ジクロベンチアゾクス粒

適用病害虫と使用方法

2024年1月31日現在

作物名	適用病害虫	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロラントラニプロールを含む農薬の総使用回数	トリフルメゾピリムを含む農薬の総使用回数	ジクロベンチアゾクスを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ウカ類 コブノメイガ	1kg/10a	移植時	1回	側条施用	1回	1回	3回以内(但し、移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内)
稲(箱育苗)	いもち病 白葉枯病 内穎褐変病 穂枯れ(ごま葉枯病菌) もみ枯細菌病 ウカ類 イネヌズウムシ イネトコイムシ コブノメイガ ニカメイチュウ フタホトコヤガ ツマゲロコバエ イネツトムシ	高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g)	は種時(覆土前)~移植当日	1回	育苗箱の上から均一に散布する。	1回	1回	
			は種前		育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する			
	いもち病 ウカ類	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g	は種時(覆土前)		育苗箱の上から均一に散布する。			
	苗立枯細菌病 苗腐敗症(もみ枯細菌病)							

適用拡大登録月日：2024年01月31日

ブーンゼクテラ箱粒剤（クロラントラニリプロール・トリフルメゾピリム・ジクロベンチアゾクス粒

適用病害虫と使用方法

2024年1月31日現在

作物名	適用病害虫	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロラントラニリプロールを含む農薬の総使用回数	トリフルメゾピリムを含む農薬の総使用回数	ジクロベンチアゾクスを含む農薬の総使用回数
稲(箱育苗)	苗立枯細菌病 苗腐敗症(もみ枯細菌病菌)	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g	は種時(覆土前)	1回	育苗箱の上から均一に散布する。	1回	1回	3回以内(但し、移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内)
		高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g)						

適用拡大登録月日：2024年01月31日