

トップガンR 1キログラム剤 (ピリミノバックメチル・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル・ペントキ

適用雑草と使用方法

2020年4月22日現在

作物名	適用雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数	ブロモブチドを含む農薬の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数	ペントキサザンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	ウリカ オモダカ クログワイ シズイ セリ ヒルムシロ ハラオモダカ ホタルイ マツバ ミズガヤツリ 一年生雑草 アオシロ・藻類による表層はく離	1kg/10a	移植直後～ノビE3葉期（但し、移植後30日まで）	1回	湛水散布	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内
			移植時		田植同時散布機で施用				
直播水稻	ウリカ セリ ヒルムシロ ハラオモダカ ホタルイ マツバ ミズガヤツリ 一年生雑草		稲1葉期～ノビE3葉期（但し、収穫90日前まで）		湛水散布				

トップガンR 1キログラム剤 (ピリミノバックメチル・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル・ペントキ

適用雑草と使用方法

2020年4月22日現在

作物名	適用雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数	ブロモブチドを含む農薬の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数	ペントキサザンを含む農薬の総使用回数
直播水稻		1kg/10a	稲1葉期～13葉期 (但し、収穫90日前まで)	1回	湛水散布	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内