

トップガンGT 1キロ粒剤75 (ピリミノバックメチル・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル・ペ

適用雑草と使用方法

2009年9月15日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数	ブロモブチドを含む農薬の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数	ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 ウリカ オモダカ(東北) クダワイ(東北) シスイ(東北) セリ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ(東北) アオイトロ・藻類 による表層はく離	移植直後～ ル ⁶ I3葉期 (但し、移植後30日まで)	砂壤土～ 埴土	1kg/10a	1回	湛水散布	北海道、 東北	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内
		移植時				田植同時散布機で施用					
直播水稻	水田一年生雑草 ウリカ セリ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ	稲1葉期～ ル ⁶ I3葉期 (但し、収穫90日前まで)				湛水散布					

トップガンGT 1キログラム剤75（ピリミノバックメチル・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル・ペ

適用雑草と使用方法

2009年9月15日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数	ブロモブチドを含む農薬の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数	ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数
直播水稻	水田一年生雑草 ウリカワ セリ ヒルムシロ ハラオモガカ ホタルイ マツバ ミスガヤツリ	稲1葉期～ 13葉期（但 し、収穫90 日前まで）	砂壤土～ 埴土	1kg/10a	1回	湛水散布	北海道、 東北	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内