

ロイヤント乳剤（フロルピラウキシフェンベンジル乳剤）

適用雑草と使用方法

2022年12月7日現在

作物名	適用雑草名	使用液量	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フロルピラウキシフェンベンジルを含む農薬の総使用回数
移植水稻	ノビエ ウリカワ セリ マツバエ ミスガヤツリ 一年生広葉雑草	25～100L/10a	200ml/10a	移植後20日～ノビエ5葉期（但し、収穫45日前まで）	2回以内	落水散布、ごく浅く湛水して散布又は湛水散布	3回以内
	エゾノサヤヌカゲサ オモダカ シスイ ナガエツルノゲイトウ アセガヤ					落水散布又はごく浅く湛水して散布	
直播水稻	ノビエ ウリカワ セリ ミスガヤツリ 一年生広葉雑草	100L/10a		稲3葉期～ノビエ5葉期（但し、収穫45日前まで）		乾田・落水状態で雑草茎葉散布又は全面散布	

ロイヤント乳剤（フロルピラウキシフェンベンジル乳剤）

2022年12月7日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用液量	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フロルピラウキシフェンベンジルを含む農業の総使用回数
水稻(水田畦畔)	水田畦畔	一年生及び多年生広葉雑草	25～100L/10a	200ml/10a	収穫45日前まで(雑草生育期)	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内